

	<p>10w Wechseltrockener Lungenkraut-/ Platt- erbsen-Buchenwald mit Immenblatt <i>Pulmonario-/ Lathyro-Fagetum melittetosum, Carex flacca- Variante</i></p>	<p>11 Aronstab-Buchenwald <i>Aro-Fagetum</i></p>
Naturwald	Buchenwald in dem Waldföhre, teilweise Eibe und fast alle Laubbäume beigemischt sein können. Pionierbaumarten	Mischwald mit dominierender Buche, Bergahorn und Esche; Stieleiche, Kirsche. Pionierbaumarten. Gerade Stämme.
Max. Bestandeshöhe	18 - 28 m.	30 - 40 m.
Standortsregion	Jura (J), Mittelland (M), nördliche Randalpen (1)	Jura (J), Mittelland (M), nördliche Randalpen (1)
Standort allgemein	Flache und steile Hänge, meist Mergel	Hangfuss- und Tallagen, Kalk
Boden		
Humusform	Mull (Kalkmull)	Mull
Entwicklung	Rendzina, manchmal etwas verbraunt	Rendzina, Regosol oder Braunerde, alle leicht vernässt
Eigenschaften	Skelettgehalt eher tief, kalkreich, Gründigkeit mittel bis gering, biologische Aktivität durch Trockenheit eingeschränkt, wechselnder Bodenwasserhaushalt, Durchlässigkeit normal bis leicht gehemmt	Gründigkeit tief, biologische Aktivität hoch, Wurzelraum für Buchen noch genügend durchlüftet, Durchlässigkeit leicht gehemmt, Vernässung leicht bis mittel
Vegetation Aspekt und häufige Arten	<p>Krautreich bis lückig. Oft Seggen- und Grasrasen. Wechselfeucht/-trocken: Schlawe Segge (<i>Carex flacca</i>) (rasig); in Baumschicht eher mehr Waldföhren Basisch, trocken: Weissegge (<i>Carex alba</i>), Braunrote Sumpfwurze (<i>Epipactis atrorubens</i>), Rotes und langblättriges Waldvögelein (<i>Cephalanthera rubra/longifolia</i>) Basisch, mässig trocken: Jura: Immenblatt (<i>Melittis melissophyllum</i>) Extrem basisch (Kalk): Frühlingsplatterbse (<i>Lathyrus vernus</i>), Haselwurze (<i>Asarum europaeum</i>), Stinkende Nieswurze (<i>Helleborus foetidus</i>), Türkenbund (<i>Lilium martagon</i>) Basisch: Binglekraut (<i>Mercurialis perennis</i>), Lungenkraut (<i>Pulmonaria obscura/officinalis</i>), Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>, niederliegend) Mittel: Waldsegge (<i>Carex sylvatica</i>), Waldmeister (<i>Galium odoratum</i>), Klebrige Salbei (<i>Salvia glutinosa</i>), Berggoldnessel (<i>Lamium galeobdolon ssp. montanum</i>)</p>	<p>Krautig. Oft dominiert de Bärlauch, er kann aber auch fehlen. Feucht, basisch: Bärlauch (<i>Allium ursinum</i>), Gundelrebe (<i>Glechoma hederaceum</i>), Märzenglökkchen (<i>Leucjum vernum</i>) Basisch, frisch: Aronstab (<i>Arum maculatum</i>) Feucht: Hängende Segge (<i>Carex pendula</i>), Waldziest (<i>Stachys sylvatica</i>), Grosses Hexenkraut (<i>Circaea lutetiana</i>), Geissfuss (<i>Aegopodium podagraria</i>) Mittel bis feucht, tonig: Waldschlüsselblume (<i>Primula elatior</i>), Sanikel (<i>Sanicula europaea</i>), Einbeere (<i>Paris quadrifolia</i>), Buschwindröschen (<i>Anemone nemorosa</i>), Vielblütiger Salomonsiegel (<i>Polygonatum multiflorum</i>) Extrem basisch (Kalk): Frühlingsplatterbse (<i>Lathyrus vernus</i>), Haselwurze (<i>Asarum europaeum</i>), Stinkende Nieswurze (<i>Helleborus foetidus</i>), Türkenbund (<i>Lilium martagon</i>) Basisch: Binglekraut (<i>Mercurialis perennis</i>), Lungenkraut (<i>Pulmonaria obscura/officinalis</i>) Mittel: Waldmeister (<i>Galium odoratum</i>), Berggoldnessel (<i>Lamium galeobdolon ssp. montanum</i>), Waldsegge (<i>Carex sylvatica</i>), Efeu (<i>Hedera helix</i>)</p>
Idealisiertes Bestandesprofil		