

	14 Seggen-Buchenwald mit Weissegge <i>Carici (albae)-Fagetum typicum</i>	15 Seggen-Buchenwald mit Bergsegge <i>Carici-Fagetum caricetosum montanae</i>
Naturwald	Buchenwald mit Eichen und anderen wärmeliebenden Baumarten; oft knorrige Stämme. Pionierbaumarten	Buchenwald mit Eichen und anderen wärmeliebenden Baumarten; oft knorrige Stämme. Pionierbaumarten
Max. Bestandeshöhe	15 - 25 m.	15 - 25 m.
Standortsregion	Jura (J), Mittelland (M), nördliche Rand- und Zwischenalpen (1, 2), auch untermontan	Jura (J), Mittelland (M), nördliche Rand- und Zwischenalpen (1, 2), auch untermontan
Standort allgemein	Warme, trockene Standorte auf Kalk.	Warme, trockene Standorte auf Kalk- oder Mischgesteins-Untergrund, oberflächlich versauert.
Boden		
Humusform	Kalkmull (stellenweise trockene Ausprägung)	Mull oder Moder (trockene Ausprägung)
Entwicklung	Rendzina, stellenweise Gesteinsrohboden	Rendzina, Regosol, oberflächlich versauert, teils verbraunt
Eigenschaften	Skelettgehalt hoch, mittel- bis flachgründig, normal bis übermässig durchlässig	Skelettgehalt hoch, mittel- bis flachgründig, normal bis übermässig durchlässig
Vegetation Aspekt und häufige Arten	Krautig oder gras-/seggenreich. Oft strauchreich. Basisch, trocken: Weissegge (<i>Carex alba</i>), Maiglöckchen (<i>Convallaria majalis</i>), Schwalbenwurz (<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>), Gemeine Weisswurz (<i>Polygonatum odoratum</i>), Strauchwicke (<i>Hippocrepis emerus</i>), Braunrote Sumpfwurz (<i>Epipactis atrorubens</i>), Rotes und langblättriges Waldvögelein (<i>Cephalanthera rubra/longifolia</i>) Basisch, mässig trocken: Leberblümchen (<i>Hepatica nobilis</i>), Jura: Immenblatt (<i>Melittis melissophyllum</i>) Basisch: Hornstrauch (<i>Cornus sanguinea</i>), Wolliger Schneeball (<i>Viburnum lantana</i>), Feldahorn (<i>Acer campestre</i>), Frühlingsplatterbse (<i>Lathyrus vernus</i>), Gemeines Alpenveilchen (<i>Cyclamen purpurascens</i>), Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>)	Krautig oder gras-/seggenreich. Oft strauchreich. Trocken, sauer: Weissliche Hainsimse (<i>Luzula luzuloides</i>), Schneesimse (<i>Luzula nivea</i>), Salbeiblättriger Gamander (<i>Teucrium scorodonia</i>) Mässig trocken: Bergsegge (<i>Carex montana</i>) Basisch, trocken: Maiglöckchen (<i>Convallaria majalis</i>), Schwalbenwurz (<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>), Strauchwicke (<i>Hippocrepis emerus</i>), Gemeine Weisswurz (<i>Polygonatum odoratum</i>), Braunrote Sumpfwurz (<i>Epipactis atrorubens</i>), Rotes und langblättriges Waldvögelein (<i>Cephalanthera rubra/longifolia</i>) Basisch, mässig trocken: Leberblümchen (<i>Hepatica nobilis</i>), Jura: Immenblatt (<i>Melittis melissophyllum</i>) Basisch: Hornstrauch (<i>Cornus sanguinea</i>), Wolliger Schneeball (<i>Viburnum lantana</i>), Feldahorn (<i>Acer campestre</i>), Frühlingsplatterbse (<i>Lathyrus vernus</i>), Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>)
Idealisiertes Bestandesprofil		