

	9w Wechselfeuchter Lungenkraut-/ Platterbsen-Buchenwald <i>Pulmonario-/ Lathyro-Fagetum caricetosum flacca</i>	10a Lungenkraut-/ Platterbsen- Buchenwald mit Immenblatt <i>Pulmonario-/ Lathyro-Fagetum melittetosum</i>
Naturwald	Buchenwald, in dem fast alle Laubbaumarten eingestreut sein können. Pionierbaumarten	Buchenwald in dem Waldföhre und fast alle Laubbäume beigemischt sein können. Pionierbaumarten
Max. Bestandeshöhe	20 - 30 m.	18 - 28 m.
Standortsregion	Jura (J), Mittelland (M), nördliche Randalpen (1)	Jura (J), Mittelland (M), nördliche Randalpen (1), seltener nördliche Zwischenalpen (2a)
Standort allgemein	Hanglagen, meist Mergel	Flache und steile Hänge, trockene Lagen, Kalk
Boden	Humusform	Humusform
	Mull, stellenweise Kalkmull	Mull (Kalkmull), stellenweise trockene Ausprägung
Entwicklung	Rendzina oder Pararendzina, manchmal etwas verbraunt	Rendzina, manchmal etwas verbraunt
Eigenschaften	Gründigkeit mittel, biologische Aktivität mittel bis hoch, wechselnder Bodenwasserhaushalt, gelegentliche Sommertrockenheit, Durchlässigkeit normal bis leicht gehemmt	Skelettgehalt mittel bis hoch kalkreich, Gründigkeit mittel bis gering, biologische Aktivität durch Trockenheit eingeschränkt, normal bis übermässig durchlässig
Vegetation Aspekt und häufige Arten	Oft dominieren Schlawe Segge und/oder Kalkzeiger. Extrem basisch (Kalk): Frühlingsplatterbse (<i>Lathyrus vernus</i>), Haselwurz (<i>Asarum europaeum</i>), Stinkende Nieswurz (<i>Helleborus foetidus</i>), Türkenbund (<i>Lilium martagon</i>), Schmerwurz (<i>Tamus communis</i>) Wechselfeucht/-trocken: Schlawe Segge (<i>Carex flacca</i>) (rasig) Basisch: Binglekraut (<i>Mercurialis perennis</i>), Lungenkraut (<i>Pulmonaria obscura/officinalis</i>), Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>) (niederliegend) Mittel (seltener): Waldmeister (<i>Galium odoratum</i>), Berggoldnessel (<i>Lamium galeobdolon ssp. montanum</i>), Klebrige Salbei (<i>Salvia glutinosa</i>), Waldsegge (<i>Carex sylvatica</i>)	Krautreich bis lückig. Oft Seggen- und Gräserasen. Basisch, trocken: Weisssegge (<i>Carex alba</i>), Braunrote Sumpfwurz (<i>Epipactis atrorubens</i>), Rotes und langblättriges Waldvögelein (<i>Cephalanthera rubra/longifolia</i>) Basisch, mässig trocken: Immenblatt (<i>Melittis melisso-phyllum</i>) Extrem basisch (Kalk): Frühlingsplatterbse (<i>Lathyrus vernus</i>), Haselwurz (<i>Asarum europaeum</i>), Stinkende Nieswurz (<i>Helleborus foetidus</i>), Türkenbund (<i>Lilium martagon</i>) Basisch: Binglekraut (<i>Mercurialis perennis</i>), Gemeines Alpenveilchen (<i>Cyclamen purpurascens</i>), Lungenkraut (<i>Pulmonaria obscura/officinalis</i>) Mittel: Waldsegge (<i>Carex sylvatica</i>), Waldmeister (<i>Galium odoratum</i>), Klebrige Salbei (<i>Salvia glutinosa</i>), Berggoldnessel (<i>Lamium galeobdolon ssp. montanum</i>)
Idealisiertes Bestandesprofil		