

	<p>3VL Nährstoffarmer Buchenwald mit Stechpalme <i>Illici-Fagetum typicum</i> (verarmte Variante)</p>	<p>3mL-4L Mesophiler Buchenwald mit Stechpalme <i>Illici-Fagetum typicum</i> und <i>dryopteridetosum</i></p>
Naturwald	Buche, Traubeneiche und Kastanie dominieren. In der Unterschicht: Stechpalme. In der Oberschicht beigemischt: Birke, Mehlbeere, evt. Tanne.	Buche dominiert. In der Unterschicht Stechpalme, Eibe. In der Oberschicht beigemischt Traubeneiche, Birke, Kastanie, Linde (4L). Ahorn, Esche, Kirsche, Schwarzerle. Laurophylle Arten. Auch Tanne ist hier potentiell möglich
Max. Bestandeshöhe	15 - 20 m.	20 - 33 m.
Standortsregion	Südliche Randalpen (vor allem in 5b)	Südliche Randalpen (5)
Standort allgemein	Hanglagen, meistens Schattenlagen. Bis 800 (1000) m über Meer	Hanglagen, oft auf Porphy oder Moränen, meistens Schattenhänge. Bis 800 (1000) m über Meer
Boden		
Humusform	Moder, teilweise trockene Ausprägung	Moder, stellenweise Mull
Entwicklung	Podsolierte Braunerde, Humuspodsol, Ranker	Saure Braunerde, schwach podsoliert
Eigenschaften	Skelettgehalt mittel bis tief, Gründigkeit mittel, normal durchlässig	Skelettgehalt tief bis mittel, tiefgründig, normal durchlässig
Vegetation Aspekt und häufige Arten	<p>Spärliche Krautschicht, viel Stechpalme und Eibe in der Strauchschicht Sauer: Gemeiner Tüpfelfarn (<i>Polypodium vulgare</i>), Heidelbeere (<i>Vaccinium myrtillus</i>), Drahtschmiele (<i>Avenella flexuosa</i>), Zweiblättrige Schattenblume (<i>Majanthemum bifolium</i>), Rohrreitgras (<i>Calamagrostis arundinacea</i>) Sauer, trocken: Schneesimse (<i>Luzula nivea</i>), Wiesenwachtelweizen (<i>Melampyrum pratense</i>), Salbeiblättriger Gaman-der (<i>Teucrium scorodonia</i>) Trocken: Schwalbenwurz (<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>) Wechsell trocken: Strandpfeifengras (<i>Molinia arundinacea</i>)</p>	<p>Spärliche Krautschicht, viele immergrüne Sträucher, Efeu auch in Baumschicht Sauer, trocken: Schneesimse (<i>Luzula nivea</i>), Wiesenwachtelweizen (<i>Melampyrum pratense</i>) Trocken: Schwalbenwurz (<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>) Mittel, frisch: Buschwindröschen (<i>Anemone nemorosa</i>), Blassgelbe Goldnessel (<i>Lamium galeobdolon ssp. flavidum</i>), Vielblütiger Salomonsiegel (<i>Polygonatum multiflorum</i>) Wechsell trocken: Strandpfeifengras (<i>Molinia arundinacea</i>) Mittel, luftfeucht (nur in 4L): Gemeiner Waldfarn (<i>Athyrium filix-femina</i>), Gemeiner Wurm- farn (<i>Dryopteris filix-mas</i>), Waldgeissbart (<i>Aruncus dioecus</i>)</p>
Idealisiertes Bestandesprofil		