

	65 Erika-/ Strauchwicken-Föhrenwald <i>Erico- / Coronillo-Pinetum sylvestris</i>	65* Hauhechel-Föhrenwald <i>Ononido-Pinetum sylvestris</i>
Naturwald	Föhrenwald mit Mehlbeere, Vogelbeere, selten Eiche (Jura), Pionierbaumarten, viele Sträucher (z. B. Felsenmispel, Amelanchier ovalis)	Lichter Föhrenwald, manchmal mit eingestreuten Fichten und Lärchen, im Wallis auch Flaumeichen, Birke, Esche, Kirsche; Pionierbaumarten.
Max. Bestandeshöhe	10 -20 m.	7 bis 15 m.
Standortsregion	Jura (J), Mittelland (M), nördliche Rand- und Zwischenalpen (1, 2), Kontinentale Hochalpen (3), unter- und obermontan, Regionen 2 und 3 auch hochmontan	Kontinentale Hochalpen (3), seltener nördliche Zwischenalpen (2). Collin bis hochmontan.
Standort allgemein	Trockene Hänge und Kreten mit Kalk- oder Dolomitunterlage.	Kontinentales Klima. Sehr trockene Hänge auf Kalk und Dolomit.
Boden		
Humusform	Kalkmull (trockene Ausprägung), teils erodiert, stellenweise Moder (trockene Ausprägung)	Kalkmoder (trockene Ausprägung), z. T. erodiert.
Entwicklung	Rendzina, Pararendzina, Gesteinsrohboden	Rendzina, Pararendzina, Gesteinsrohboden
Eigenschaften	Skelettgehalt hoch, flachgründig, übermässig durchlässig	Skelettgehalt hoch, flachgründig, übermässig durchlässig
Vegetation Aspekt und häufige Arten	Krautig oder gras-/seggenreich. Oft strauchreich. Basisch, trocken: Erika (<i>Erica carnea</i>), Zwergbuchs (<i>Polygala chamaebuxus</i>), Blaugras (<i>Sesleria caerulea</i>), Weisssegge (<i>Carex alba</i>), Weidenblättriges Rindsauge (<i>Buphthalmum salicifolium</i>), Braunrote Sumpfwurzel (<i>Epipactis atrorubens</i>), Ästige Graslinie (<i>Anthericum ramosum</i>), Strauchwicke (<i>Hippocrepis emerus</i>), Blutroter Storchenschnabel (<i>Geranium sanguineum</i>), Gemeine Berberitze (<i>Berberis vulgaris</i>) Basisch, mässig trocken: Nickendes Perlgras (<i>Melica nutans</i>) Wechselfeucht: Buntreitgras (<i>Calamagrostis varia</i>) Trocken, sauer: Wiesenwachtelweizen (<i>Melampyrum pratense</i>) Extrem trocken: Felsenmispel (<i>Amelanchier ovalis</i>)	Flecken mit Gräsern, Seggen und/oder Kräutern zwischen solchen von mit Streuauflage oder nackter Mineralerde. Basisch, trocken: Fiederzwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i>), Zwergbuchs (<i>Polygala chamaebuxus</i>), Gemeine Berberitze (<i>Berberis vulgaris</i>) Trocken: Immergrüne Bärentraube (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>) Extrem trocken: Rotes Seifenkraut (<i>Saponaria ocymoides</i>), Rundblättriger Hauhechel (<i>Ononis rotundifolia</i>), Französ. Tragant (<i>Astragalus monspessulanus</i>), Hufeisenklee (<i>Hippocrepis comosa</i>), Edelgamander (<i>Teucrium chamaedrys</i>), Niedrige Segge (<i>Carex humilis</i>), Skabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>), Felsenmispel (<i>Amelanchier ovalis</i>) Wechselfeucht: Buntreitgras (<i>Calamagrostis varia</i>)
Idealisiertes Bestandesprofil		