

	<p><b>12w Wechselfeuchter Binglekraut-/ Zahnwurz-Buchenwald</b>  <i>Mercuriali-/Cardamino-Fagetum caricetosum flacca</i></p>	<p><b>13a Typischer Linden-Buchenwald</b>  <i>Tilio-Fagetum typicum</i></p>
Naturwald	Buchenwald mit Bergahorn, Sommerlinde und teilweise Eibe. Pionierbaumarten	Buche dominiert, daneben spielen Linde und Bergahorn eine wichtige Rolle; dazu Esche und Pionierbaumarten
Max. Bestandeshöhe	20-30 m.	20-30 m.
Standortsregion	Jura (J), Mittelland (M), nördliche Randalpen (1)	Jura (J), Mittelland (M), nördliche Randalpen (1), auch submontan.
Standort allgemein	<b>Hänge mit mässig bewegtem Kalkschutt, meist Mergel;</b> Nord- (submontan) bis Süd-Exposition	<b>Hänge mit mässig bewegtem Kalkschutt, frisch;</b> Nord- (submontan) bis Süd-Exposition
Boden		
Humusform	Mull (Kalkmull)	Mull (Kalkmull)
Entwicklung	Rendzina, teils verbraunt	Rendzina, Gesteinsrohboden
Eigenschaften	Wechselfeucht bis wechsell trocken, Skelettgehalt tief bis mittel, Gründigkeit mittel bis gering, kalkreich, biologische Aktivität hoch, Durchlässigkeit normal bis leicht gehemmt	Humusreiche Kalkschuttböden; hoher Skelettanteil, Gründigkeit mittel bis tief, starke biologische Aktivität, normal bis übermässig durchlässig
Vegetation Aspekt und häufige Arten	<p><b>Oft Seggen- und Grasrasen.</b>  <b>Wechselfeucht/-trocken:</b> Schlaffe Segge (<i>Carex flacca</i>) (rasig), seltener Buntreitgras (<i>Calamagrostis varia</i>)  <b>Basisch, trocken:</b> Weisssegge (<i>Carex alba</i>), Braunrote Sumpfwurzel (<i>Epipactis atrorubens</i>), Rotes und langblättriges Waldvögelein (<i>Cephalanthera rubra/longifolia</i>), Strauchwicke (<i>Hippocrepis emerus</i>), Schwalbenwurz (<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>),  <b>Basisch, mässig trocken: Jura:</b> Immenblatt (<i>Melittis melissophyllum</i>)  <b>Basisch:</b> Binglekraut (<i>Mercurialis perennis</i>), Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>) (niederliegend)  <b>Extrem basisch (Kalk)</b> Fiederblättrige Zahnwurz (<i>Cardamine heptaphylla</i>), Frühlingsplatterbse (<i>Lathyrus vernus</i>), Stinkende Nieswurz (<i>Helleborus foetidus</i>)</p>	<p><b>Krautig. Oft dominieren Fiederblättrige Zahnwurz oder Binglekraut, manchmal Farne.</b>  <b>Steine sichtbar. Verletzungen an Baumstämmen.</b>  <b>Extrem basisch (Kalk):</b> Fiederblättrige Zahnwurz (<i>Cardamine heptaphylla</i>), Frühlingsplatterbse (<i>Lathyrus vernus</i>), Stinkende Nieswurz (<i>Helleborus foetidus</i>), Schmerwurz (<i>Tamus communis</i>)  <b>Basisch:</b> Binglekraut (<i>Mercurialis perennis</i>), Gelappter Schildfarn (<i>Polystichum aculeatum</i>)  <b>Mittel:</b> Waldmeister (<i>Galium odoratum</i>), Berggoldnessel (<i>Lamium galeobdolon ssp. montanum</i>), Ährige Rapunzel (<i>Phyteuma spicatum</i>)  <b>Basisch, Schutt: Vereinzelt:</b> Hirschzunge (<i>Phyllitis scolopendrium</i>), Moos-Nabelmiere (<i>Moehringia muscosa</i>)</p>
Idealisiertes Bestandesprofil		