

	<b>8a Typischer Waldhirsens-Buchenwald</b> <i>Milio-Fagetum typicum</i>	<b>8S Feuchter Waldhirsens-Buchenwald</b> <i>Milio-Fagetum stachyetosum sylvaticae</i>
<b>Naturwald</b>	Hochstämmiger Buchenwald mit beigemischter Tanne, dazu Bergahorn und Esche; keine Eiche, Hagebuche, Kirsche; gerade Stämme. Pionierbaumarten	Hochstämmiger Mischwald mit Buche, beigemischter Tanne, Bergahorn und Esche; keine Eiche, Hagebuche, Kirsche; gerade Stämme. Pionierbaumarten
<b>Max. Bestandeshöhe</b>	30 - 40 m.	30 - 40 m.
<b>Standortsregion</b>	Jura (J, Täler), Mittelland (M), nördliche Randalpen (1), seltener nördliche Zwischenalpen (2a)	Jura (J, Täler), Mittelland (M), nördliche Randalpen (1)
<b>Standort allgemein</b>	<b>Ebenen und Hänge</b> (ausser Steilhänge), in tiefen Lagen Schattenhänge.	<b>Hangfuss- und Tallagen</b> , in tiefen Lagen Schattenhänge.
<b>Boden</b>	Humusform	Mull
	Entwicklung	Braunerde, Parabraunerde
	Eigenschaften	Braunerde leicht vernässt oder Parabraunerde leicht vernässt
<b>Vegetation Aspekt und häufige Arten</b>	<b>Krautreich bis lückig. Oft viele Farne. Unter Fichten oft dichte Brombeerdecke.</b> <b>Mittel:</b> Waldmeister ( <i>Galium odoratum</i> ), Berggoldnessel ( <i>Lamium galeobdolon ssp. montanum</i> ), Waldsegge ( <i>Carex sylvatica</i> ), Gemeiner Waldfarn ( <i>Athyrium filix-femina</i> ), Waldhirse ( <i>Milium effusum</i> ), Gemeiner Wurmfarne ( <i>Dryopteris filix-mas</i> ), Buschwindröschen ( <i>Anemone nemorosa</i> ), Vielblütiger Salomonsiegel ( <i>Polygonatum multiflorum</i> ), Waldgeissbart ( <i>Aruncus dioecus</i> ), Efeu ( <i>Hedera helix</i> ) <b>Oberflächlich sauer:</b> Waldschwingel ( <i>Festuca altissima</i> ), Sauerklee ( <i>Oxalis acetosella</i> ) <b>Unter Fichten häufiger:</b> Rundblättriges Labkraut ( <i>Galium rotundifolium</i> ), Brombeere ( <i>Rubus sp.</i> )	<b>Krautreich. Oft viele Farne.</b> <b>Feucht:</b> Hängende Segge ( <i>Carex pendula</i> ), Waldziest ( <i>Stachys sylvatica</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens sp.</i> ), Grosses Hexenkraut ( <i>Circaea lutetiana</i> ), Geissfuss ( <i>Aegopodium podagraria</i> ) <b>Mittel bis feucht, tonig:</b> Waldschlüsselblume ( <i>Primula elatior</i> ), Sanikel ( <i>Sanicula europaea</i> ), Waldgerste ( <i>Hordeolum europaeus</i> ), Fuchs Greiskraut ( <i>Senecio ovatus</i> ) <b>Mittel:</b> Berggoldnessel ( <i>Lamium galeobdolon ssp. montanum</i> ), Waldsegge ( <i>Carex sylvatica</i> ), Gemeiner Waldfarn ( <i>Athyrium filix-femina</i> ), Waldhirse ( <i>Milium effusum</i> ), Gemeiner Wurmfarne ( <i>Dryopteris filix-mas</i> ), Buschwindröschen ( <i>Anemone nemorosa</i> ), Vielblütiger Salomonsiegel ( <i>Polygonatum multiflorum</i> ), Waldgeissbart ( <i>Aruncus dioecus</i> ), Efeu ( <i>Hedera helix</i> )
<b>Idealisiertes Bestandesprofil</b>		