


## 8.2 Standortsregion Mittelland (M) Ökogramm Mittelland (Region M) hochmontan Hauptareal der Tanne



### Höhenverbreitung:

Über etwa 1200 m über Meer (meist über 1300 m)

**Standort:** Vor allem auf nadelholzfördernder

Unterlage

**Bestand:** Tanne und Fichte dominieren, dazu Vogelbeere, evt. Bergahorn. Oft gleichförmige Struktur. Konkurrenz zwischen den Bäumen gross. Vorherrschende Wuchsformen der Fichte: Bürsten- und Kammfichten.

**Verjüngung:** Flächig möglich; nur wenig dauernd ungünstige Kleinstandorte

**Standortstypen mit abweichender Baumartenzusammensetzung:** Laubwälder (27\*), Bergföhrenwälder (67, 69, 70)

**Max. Bestandeshöhe:** 50, 51: 30 – 40 m;

46: 25 – 35 m; 46M: 20 – 35 m; 46\*, 49, 60\*: 20 – 30 m; 53: 15 – 25 m; 27\*: 15 – 20 m; 67, 69, 70: 4 – 15 m

**Sonderwaldstandorte:** 23, 24\*, 48, 56, 57BI, 71

**Zusätzliche Standortstypen:** Auenwald (32)

### Zeigerpflanzen:

**Arten, die hochmontan vorkommen können, aber obermontan meistens fehlen:**

Alpenwaldfarn (*Athyrium distentifolium*)  
Wollreitgras (*Calamagrostis villosa*)  
Alpenmilchblätlich (*Cicerbita alpina*)  
Gelbliche Hainsimse (*Luzula luzulina*)  
Meisterwurz (*Peucedanum ostruthium*)  
Gewelltes Wurmmoos (*Plagiothecium undulatum*)  
Fедermoos (*Ptilium crista-castrensis*)

### 60\* Buntreitgras-Fi-Wald

(Kalk-)Moder, -Mull; Regosol, (Para-)Rendzina, t. vernässt