

	14 Hêtraie à Laiche typique <i>Carici (albae)-Fagetum typicum</i>	15 Hêtraie à Laiche avec Laiche des montagnes <i>Carici-Fagetum caricetosum montanae</i>
Forêt naturelle	Hêtraie avec chênes et autres essences aimant la chaleur; troncs souvent noueux; essences pionnières.	Hêtraie avec chênes et autres essences aimant la chaleur; troncs souvent noueux; essences pionnières.
Hauteur max. du peuplement	15 à 25 m	15 à 25 m
Ecorégion	Jura (J), Plateau (M), Alpes externes et intermédiaires du Nord (1, 2), aussi étage montagnard inférieur.	Jura (J), Plateau (M), Alpes externes et intermédiaires du Nord (1, 2), aussi étage montagnard inférieur.
Station: données générales	Stations chaudes, sèches, sur sol calcaire.	Stations chaudes, sèches, sur sous-sol calcaire ou roches mélangées, acidifiées en surface.
Sol:		
Forme d'humus	Mull calcique (par endroits xérique).	Mull ou moder (xérique).
Développement	Rendzine, par endroits sol brut rocheux.	Rendzine, régosol, acidifiés en surface, en partie brunifiés.
Caractéristiques	Très pierreux, sol moyen à superficiel, perméabilité normale à extrême.	Très pierreux, sol moyen à superficiel, perméabilité normale à extrême.
Végétation: aspect et espèces fréquentes	<p>Herbeux ou riche en graminées/laiches. Souvent riche en buissons.</p> <p>Sec, basique: laiche blanche (<i>Carex alba</i>), muguet (<i>Convallaria majalis</i>), dompte-venin officinal (<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>), sceau de Salomon officinal (<i>Polygonatum odoratum</i>), hippocrévide émerus (<i>Hippocrepis emerus</i>), épipactis pourpre noirâtre (<i>Epipactis atrorubens</i>), céphalanthère rouge et céphalanthère à longues feuilles (<i>Cephalanthera rubra/longifolia</i>)</p> <p>Basique, assez sec: hépatique à trois lobes (<i>Hepatica nobilis</i>), Jura: mélitte à feuilles de mélisse (<i>Melittis melissophyllum</i>)</p> <p>Basique: cornouiller sanguin (<i>Cornus sanguinea</i>), viorne lantane (<i>Viburnum lantana</i>), érable champêtre (<i>Acer campestre</i>), gesse printanière (<i>Lathyrus vernus</i>), cyclamen pourpre (<i>Cyclamen purpurascens</i>)</p> <p>Humidité variable: troène vulgaire (<i>Ligustrum vulgare</i>)</p>	<p>Herbeux ou riche en graminées/laiches. Souvent riche en buissons.</p> <p>Sec, acide: luzule des bosquets (<i>Luzula luzuloides</i>), luzule blanc-de-neige (<i>Luzula nivea</i>), germandrée des bois (<i>Teucrium scorodonia</i>)</p> <p>Assez sec: laiche des montagnes (<i>Carex montana</i>)</p> <p>Sec, basique: muguet (<i>Convallaria majalis</i>), dompte-venin officinal (<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>), hippocrévide émerus (<i>Hippocrepis emerus</i>), sceau de Salomon officinal (<i>Polygonatum odoratum</i>), épipactis pourpre noirâtre (<i>Epipactis atrorubens</i>), céphalanthère rouge et céphalanthère à longues feuilles (<i>Cephalanthera rubra/longifolia</i>)</p> <p>Basique, assez sec: hépatique à trois lobes (<i>Hepatica nobilis</i>), Jura: mélitte à feuilles de mélisse (<i>Melittis melissophyllum</i>)</p> <p>Basique: cornouiller sanguin (<i>Cornus sanguinea</i>), viorne lantane (<i>Viburnum lantana</i>), érable champêtre (<i>Acer campestre</i>), gesse printanière (<i>Lathyrus vernus</i>)</p> <p>Humidité variable: troène vulgaire (<i>Ligustrum vulgare</i>)</p>
Profil idéalisé du peuplement		