

	65 Pîneraie à Bruyère <i>Erico- / Coronillo-Pinetum sylvestris</i>	65* Pîneraie à Bugrane <i>Ononido-Pinetum sylvestris</i>
Forêt naturelle	Pîneraie avec alisier blanc, sorbier des oiseleurs, rarement chêne (Jura), essences pionnières, nombreux buissons (p.ex. amélanchier à feuilles ovales Amelanchier ovalis).	Pîneraie claire, quelquefois parsemée d'épicéas et de mélèzes, en Valais aussi chêne pubescent, bouleau, frêne, merisier; essences pionnières.
Hauteur max. du peuplement	10 à 20 m	7 à 15 m
Ecorégion	Jura (J), Plateau (M), Alpes externes et intermédiaires du Nord (1, 2), Hautes Alpes continentales (3), étages montagnards inférieur et supérieur, régions 2 et 3 aussi étage haut-montagnard.	Hautes Alpes continentales (3), plus rarement Alpes intermédiaires du Nord (2). Etages collinéen à haut-montagnard.
Station: données générales	Versants secs et crêtes à substrat calcaire ou dolomitique.	Climat continental. Versants très secs sur calcaire et dolomie.
Sol:		
Forme d'humus	Mull calcique (xérique), en partie érodé, par endroits moder (xérique).	Moder calcaire (xérique), en partie érodé.
Développement	Rendzine, pararendzine, sol brut rocheux.	Rendzine, pararendzine, sol brut rocheux.
Caractéristiques	Très pierreux, sol superficiel, perméabilité extrême.	Très pierreux, sol superficiel, perméabilité extrême.
Végétation: aspect et espèces fréquentes	Herbeux ou riche en graminées/laiches. Souvent riche en buissons. Basique, sec: bruyère carnée (<i>Erica carnea</i>), polygale petit buis (<i>Polygala chamaebuxus</i>), seslérie bleuâtre (<i>Sesleria caerulea</i>), laiche blanche (<i>Carex alba</i>), buphtalme à feuilles de saule (<i>Buphthalmum salicifolium</i>), épipactis pourpre noirâtre (<i>Epipactis atrorubens</i>), anthéricum rameux (<i>Anthericum ramosum</i>), hippocrépide émerus (<i>Hippocrepis emerus</i>), géranium sanguin (<i>Geranium sanguineum</i>) Basique, assez sec: mélique penchée (<i>Melica nutans</i>) Humidité variable: calamagrostide bigarrée (<i>Calamagrostis varia</i>) Sec, acide: mélampyre des prés (<i>Melampyrum pratense</i>)	Taches de graminées, laiches et/ou herbes entrecoupées de litière épaisse ou de matière minérale. Sec, basique: brachypode penné (<i>Brachypodium pinnatum</i>), polygale petit buis (<i>Polygala chamaebuxus</i>) Sec: raisin d'ours commun (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>) Très sec: saponaire rose (<i>Saponaria ocymoides</i>), bugrane à feuilles rondes (<i>Ononis rotundifolia</i>), astragale de Montpellier (<i>Astragalus monspessulanus</i>), hippocrépide à toupet (<i>Hippocrepis comosa</i>), Germandrée petit chêne (<i>Teucrium chamaedrys</i>), laiche humble (<i>Carex humilis</i>), centaurée scabieuse (<i>Centaurea scabiosa</i>) Humidité variable: calamagrostide bigarrée (<i>Calamagrostis varia</i>)
Profil idéalisé du peuplement		