



10.16 Stations forestières particulières

	22 Erblaie à Langue-de-Cerf typique <i>Phyllitido-Aceretum</i>	22C Erblaie à Corydale <i>Corydalido-Aceretum</i>
Forêt naturelle	Forêt d'érables sycomores avec frêne. Le tilleul, l'orme et des essences pionnières peuvent y être mêlés.	Erblaie, souvent avec présence du frêne et du tilleul à grandes feuilles. Essences pionnières.
Hauteur max. du peuplement	18 à 28 m	30 à 35 m
Ecorégion	Jura (J), Plateau (M), Alpes externes du Nord et du Sud (1, 5), étages submontagnard à montagnard supérieur. Pas encore précisément différencié dans la région 5.	Jura (J), Plateau (M), Alpes externes du Nord (1), plus rarement Alpes intermédiaires du Nord (2a); submontagnard et montagnard inférieur.
Station: données générales	Eboulis calcaires à gros blocs, entre lesquels se trouvent cavités et mull profond. Chutes de pierres. Souvent zone de dépôt d'un éboulement, versants ombragés.	Pieds de versants, en général sur éboulis calcaires fins et humides et la plupart du temps sur des versants ombragés.
Sol:		
Forme d'humus	Mull calcique.	Mull (mull calcaires).
Développement	Régosol, sol brut rocheux (éboulis).	Rendzines humides et régosols, parfois légèrement brunifiés, sur éboulis fins.
Caractéristiques	Extrêmement pierreuse, sol superficiel, perméabilité normale à extrême.	Pierrosité élevée, profond, activité biologique très élevée, perméabilité normale.
Végétation: aspect et espèces fréquentes	Langue de cerf entre les blocs. Eboulis: langue de cerf (<i>Phyllitis scolopendrium</i>), moehringie mousse (<i>Moehringia muscosa</i>), asplénium vert (<i>Asplenium viride</i>) Basique, frais: polystic à aiguillons (<i>Polystichum aculeatum</i>), mercuriale vivace (<i>Mercurialis perennis</i>) Riche en substances nutritives: Plus rarement: lunaire vivace (<i>Lunaria rediviva</i>), ortie dioïque (<i>Urtica dioica</i>)	Strate herbacée, notamment au printemps lorsque la corydale et/ou la nivéole dominant. Basique: corydale à tubercule creux (<i>Corydalis cava</i>) Humide, basique: nivéole du printemps (<i>Leucojum vernum</i>), ail des ours (<i>Allium ursinum</i>) Basique, frais: gouet (<i>Arum maculatum</i>) Moyen: gaillet odorant (<i>Galium odoratum</i>), lamier des montagnes (<i>Lamium galeobdolon</i> ssp. <i>montanum</i>), laiche des forêts (<i>Carex sylvatica</i>), raiponce en épi (<i>Phyteuma spicatum</i>), fougère femelle (<i>Athyrium filix-femina</i>), fougère mâle (<i>Dryopteris filix-mas</i>) Fortement basique (calcaire): cardamine à sept folioles (<i>Cardamine heptaphylla</i>) Moyen à humide: primevère élevée (<i>Primula elatior</i>), parisette à quatre feuilles (<i>Paris quadrifolia</i>)
Profil idéalisé du peuplement		

2A