

	24* Erablaie à Orme <i>Ulmo-Aceretum</i>	25 Tillaie à Aspérule de Turin <i>Asperulo taurinae-Tilietum typicum</i>
Forêt naturelle	Erable sycomore, orme de montagne et, dans les stations basses, frêne et essences pionnières. Degré de fermeture: entrouvert à clairié. Fréquents couloirs d'avalanches. En général arbres isolés. Les arbres ont souvent de larges houppiers avec des pousses en sabre. Le peuplement est souvent homogène, du fait qu'il s'est constitué après un événement important (p.ex. avalanche).	Forêt feuillue mélangée avec tilleul, frêne, érable sycomore et érable plane; essences pionnières.
Hauteur max. du peuplement	15 à 25 m	25 à 35 m
Ecorégion	Plateau (M), Alpes externes du Nord (1), plus rarement Alpes intermédiaires du Nord et du Sud (2, 4) et Alpes externes du Sud (5): étage haut-montagnard, plus rarement aussi étages montagnard supérieur et subalpin. Pas encore précisément différencié dans la région 5. Jura (J): étage montagnard supérieur et étage haut-montagnard.	Plateau (M), Alpes externes du Nord (1), étages collinéen à montagnard inférieur.
Station: données générales	Eboulis basiques en dessous de rochers qui fournissent continuellement des matériaux basiques, souvent dans une zone de couloirs d'avalanches.	Climat de föehn. Assez sec. Eboulis calcaires raides avec chutes de pierres, cavités entre les pierres. Parfois aussi dans zones rocheuses chaudes.
Sol:		
Forme d'humus	Mull, par endroits mull calcique, en partie érodé.	Mull calcique.
Développement	Régosol, pararendzine, rendzine, par endroits sol brut rocheux, sol brun, sol brun neutre.	Pararendzine, régosol, éboulis instables.
Caractéristiques	Très pierreux, profondeur moyenne à superficielle, perméabilité normale à extrême.	Extrêmement pierreux, profondeur moyenne à superficielle, perméabilité normale à extrême.
Végétation: aspect et espèces fréquentes	Strate herbacée très luxuriante, riche en mégaphorbiées avec lunaire vivace, cerfeuil lustré, cicerbite des Alpes, ortie dioïque Riche en substances nutritives: lunaire vivace (<i>Lunaria rediviva</i>), ortie dioïque (<i>Urtica dioica</i>), cerfeuil lustré (<i>Anthriscus nitida</i>), gaillet gratteron (<i>Galium aparine</i>) Basique: mercuriale vivace (<i>Mercurialis perennis</i>), dentaire à cinq folioles (<i>Cardamine pentaphyllos</i>) Basique, humide: dentaire de Kitaibel (<i>Cardamine kitaibelii</i>) Moyen: violette à deux fleurs (<i>Viola biflora</i>), gaillet odorant (<i>Galium odoratum</i>), lamier des montagnes (<i>Lamium galeobdolon ssp. montanum</i>), fougère femelle (<i>Athyrium filix-femina</i>), préanthe pourpre (<i>Prenanthes purpurea</i>) Humide (parfois mégaphorbiées): cicerbite des Alpes (<i>Cicerbita alpina</i>), pétasite blanc (<i>Petasites albus</i>), adénostyle à feuilles d'alliaire (<i>Adenostyles alliariae</i>), renoncule laineuse (<i>Ranunculus lanuginosus</i>), saxifrage à feuilles rondes (<i>Saxifraga rotundifolia</i>), chérophylle hérissé (<i>Chaerophyllum hirsutum</i>), stellaire des bois (<i>Stellaria nemorum</i>), aconit tue-loup (<i>Aconitum vulparia</i>) Engorgé: dorine (<i>Chrysosplenium sp.</i>), circe maraîcher (<i>Cirsium oleraceum</i>)	Strate buissonnante clairsemée; strate herbacée d'aspect «frais», principalement espèces des hêtraies. Basique: mercuriale vivace (<i>Mercurialis perennis</i>) Moyen: gaillet odorant (<i>Galium odoratum</i>), lamier des montagnes (<i>Lamium galeobdolon ssp. montanum</i>), dryoptéris fougère mâle (<i>Dryopteris filix-mas</i>), raiponce en épi (<i>Phyteuma spicatum</i>), sauge glutineuse (<i>Salvia glutinosa</i>), lierre (<i>Hedera helix</i>) dans la strate arborescente Assez sec: laiche digitée (<i>Carex digitata</i>) Basique, frais: actée en épi (<i>Actaea spicata</i>) Basique, assez sec: hépatique à trois lobes (<i>Hepatica nobilis</i>)
Profil idéalisé du peuplement		