

|   |   |
|---|---|
|   | <b>27* Aulnaie à Erable</b><br><i>Adenostylo-Alnetum incanae</i>  |
| <b>Forêt naturelle</b>                          | L'aune blanc et l'érable sycomore dominant, accompagnés du sorbier des oiseleurs et de quelques sapins et épicéas sur les petites stations moins engorgées. Le frêne peut aussi être présent dans les Alpes intermédiaires du Sud (région 4).<br>Degré de fermeture espacé à clairié. Arbres isolés, petits collectifs et petites troches.  |
| <b>Hauteur max. du peuplement</b>               | 15 à 20 m   |
| <b>Ecorégion</b>                                | Plateau (M), Alpes externes et intermédiaires du Nord, Alpes intermédiaires du Sud (1, 2, 4); étages haut-montagnard et subalpin.   |
| <b>Station: données générales</b>               | <b>Substrat très argileux, riche en bases, souvent schistes argileux, marnes ou flysch; souvent stations sur glissements de terrain profonds.</b><br><b>En général cuvettes, souvent le long de torrents peu encaissés. Lieux plutôt ombragés.</b>  |
| <b>Sol: Forme d'humus</b>                       | Mull hydromorphe, par endroits moder, mull calcique hydromorphe, humus très hydromorphe, en partie érodé.   |
| <b>Développement</b>                            | Sols mouillés influencés par l'eau stagnante, de pente ou de fond, par endroits régosol, pararendzine, rendzine, sol brun, tous engorgés.   |
| <b>Caractéristiques</b>                         | Pierrosité moyenne à faible, profondeur faible à moyenne, perméabilité très ralentie, engorgement moyen à fort.   |
| <b>Végétation: aspect et espèces fréquentes</b> | <b>Mégaphorbiées très luxuriantes, riches en espèces.</b><br><b>Mouillé:</b> populage ( <i>Caltha palustris</i> ), crépide des marais ( <i>Crepis paludosa</i> ), prêles des bois ( <i>Equisetum sylvaticum</i> ), cirse maraîcher ( <i>Cirsium oleraceum</i> ), dorine sp. ( <i>Chrysosplenium</i> sp.)<br><b>Mouillé, basique:</b> laiche paniculée ( <i>Carex paniculata</i> ), cratoneuron commutatum ( <i>Cratoneuron commutatum</i> )<br><b>Humide (parfois mégaphorbiées):</b> pétasite blanc ( <i>Petasites albus</i> ), adénostyle à feuilles d'alliaire ( <i>Adenostyles alliariae</i> ), renoncule laineuse ( <i>Ranunculus lanuginosus</i> ), chérophylle hérissé ( <i>Chaerophyllum hirsutum</i> ), aconit tue-loup ( <i>Aconitum vulparia</i> ), canche gazonnante ( <i>Deschampsia caespitosa</i> )<br><b>Basique, à humidité variable:</b> laiche ferrugineuse ( <i>Carex ferruginea</i> )<br>Moyen: Pensée à deux fleurs ( <i>Viola biflora</i> ), raiponce en épi ( <i>Phyteuma spicatum</i> ), gaillet odorant ( <i>Galium odoratum</i> ), lamier des montagnes ( <i>Lamium galeobdolon</i> ssp. <i>montanum</i> )<br><b>Moyen à humide:</b> parisette à quatre feuilles ( <i>Paris quadrifolia</i> ), primevère élevée ( <i>Primula elatior</i> ) |
| <b>Profil idéalisé du peuplement</b>            |   |