

	12*h Hêtraie insubrienne sur calcaire, variante d'altitude <i>Cardamino-Fagetum veratretosum</i>	13h Hêtraie à Adénostyle typique <i>Adenostylo-Fagetum typicum</i>
Forêt naturelle	Hêtraie à croissance modérée, avec quelques érables sycomores, sorbiers des oiseleurs et alisiers blancs. Le sapin et le mélèze peuvent aussi être présents.	Hêtraie avec érable sycomore.
Hauteur max. du peuplement	12 à 22 m	20 à 30 m
Ecorégion	Alpes externes du Sud (5b), étage montagnard supérieur à subalpin.	Jura (J), Plateau (M), Alpes externes du Nord (1).
Station: données générales	Versants calcaires (Trias, Lias), évite les pentes fortement ensoleillées.	Versants à éboulis calcaires peu actifs, frais; exposition nord (étage submontagnard) à sud.
Sol:		
Forme d'humus	Mull, par endroits moder, parfois xérique.	Mull (mull calcique).
Développement	Rendzine, par endroits brunifiée.	Rendzine, sol brut rocheux.
Caractéristiques	Forte pierrosité, profondeur moyenne à grande, perméabilité normale.	Eboulis calcaires riches en humus, très pierreux, profondeur moyenne à grande, forte activité biologique, perméabilité normale à extrême.
Végétation: aspect et espèces fréquentes	<p>La cardamine et les espèces montagnardes dominant.</p> <p>Humide: vérate blanc (<i>Veratrum album</i>), chérophylle hérissé (<i>Chaerophyllum hirsutum</i> sl.), renoncule laineuse (<i>Ranunculus lanuginosus</i>), grande astrance (<i>Astrantia major</i>)</p> <p>Moyen à humide: parisette à quatre feuilles (<i>Paris quadrifolia</i>)</p> <p>Moyen, air humide: véronique à feuilles d'ortie (<i>Veronica urticifolia</i>)</p> <p>Très basique (calcaire): cardamine à sept folioles (<i>Cardamine heptaphylla</i>)</p> <p>Basique: valériane triséquée (<i>Valeriana tripteris</i>), cyclamen pourpre (<i>Cyclamen purpurascens</i>), mercuriale vivace (<i>Mercurialis perennis</i>)</p> <p>Assez sec: hépatique à trois lobes (<i>Hepatica nobilis</i>)</p> <p>Basique, sec: laiche des Alpes méridionales (<i>Carex austroalpina</i>), rose de Noël (<i>Helleborus niger</i>)</p> <p>Acide en surface: oxalis petite oseille (<i>Oxalis acetosella</i>)</p> <p>Acide: homogyne des Alpes (<i>Homogyne alpina</i>), maïanthème à deux feuilles (<i>Majanthemum bifolium</i>)</p>	<p>Herbeux. L'adénostyle domine souvent. Des pierres sont visibles, les troncs des arbres sont souvent blessés.</p> <p>Très basique (calcaire): cardamine à sept folioles (<i>Cardamine heptaphylla</i>), hellébore fétide (<i>Helleborus foetidus</i>)</p> <p>Basique, frais: adénostyle glabre (<i>Adenostyles glabra</i>), polystic à aiguillons (<i>Polystichum aculeatum</i>)</p> <p>Basique: mercuriale vivace (<i>Mercurialis perennis</i>)</p> <p>Moyen: gaillet odorant (<i>Galium odoratum</i>), lamier des montagnes (<i>Lamium galeobdolon</i> ssp. <i>montanum</i>), raiponce en épi (<i>Phyteuma spicatum</i>), dryoptéris fougère mâle (<i>Dryopteris filix-mas</i>)</p> <p>Basique, éboulis: langue de cerf (<i>Phyllitis scolopendrium</i>), moehringie mousse (<i>Moehringia muscosa</i>), asplénium vert (<i>Asplenium viride</i>)</p>
Profil idéalisé du peuplement		