

	<b>18* Hêtraie à Sapin avec Laiche blanche</b> <i>Adenostyle glabrae-Abieti-Fagetum caricetosum albae</i>	<b>18w Hêtraie à Sapin avec Calamagrostide bigarrée</b> <i>Adenostylo glabrae Abieti-Fagetum calamagrostietosum variae</i>
<b>Forêt naturelle</b>	Le hêtre et le sapin dominant, accompagnés de l'épicéa, de l'érable sycomore, du frêne, du sorbier des oiseleurs, de l'alisier blanc et d'essences pionnières; dans les Alpes intermédiaires (2a) le mélèze est aussi présent. Degré de fermeture entrouvert à espacé. Arbres isolés et petits collectifs, parfois troches.	Le hêtre et le sapin dominant, accompagnés de l'épicéa, de l'érable sycomore, du frêne, de l'alisier blanc, du sorbier des oiseleurs et d'essences pionnières. Degré de fermeture entrouvert à clairié. Arbres isolés et petits collectifs, parfois troches.
<b>Hauteur max. du peuplement</b>	20 à 30 m	15 à 25 m
<b>Ecorégion</b>	Alpes intermédiaires du Nord (2a), plus rarement Jura, Plateau, Alpes externes du Nord (J, M, 1).	Jura, Plateau, Alpes externes et intermédiaires du Nord (J, M, 1, 2a)
<b>Station: données générales</b>	<b>Substrat basique (surtout calcaires), superficiel, souvent emplacements rocheux, raides, sec.</b>	<b>Humidité variable, terrain riche en bases, souvent instable. En général pentes raides.</b>
<b>Sol: Forme d'humus</b>	Mull, par endroits mull calcique, moder, variantes sèches possibles.	Mull, moder, en partie érodé, par endroits mull calcique.
<b>Développement</b>	Rendzine, par endroits pararendzine, sol brut rocheux.	Rendzine, pararendzine, par endroits sol brun.
<b>Caractéristiques</b>	Forte pierrosité, profondeur moyenne, perméabilité normale à extrême.	Pierrosité nulle à forte, sol superficiel, perméabilité légèrement à très ralentie, engorgement faible à nul.
<b>Végétation: aspect et espèces fréquentes</b>	<b>Laiche blanche et adénostyle glabre.</b> <b>Basique, sec:</b> laiche blanche ( <i>Carex alba</i> ), dompte-venin officinal ( <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> ) <b>Basique, à humidité variable:</b> laiche glauque ( <i>Carex flacca</i> ) <b>Basique:</b> adénostyle glabre ( <i>Adenostyles glabra</i> ), mercuriales vivaces ( <i>Mercurialis perennis</i> ) peu nombreuses, valériane triséquée ( <i>Valeriana tripteris</i> ) <b>Moyen:</b> prénanthe pourpre ( <i>Prenanthes purpurea</i> ), véronique à feuilles d'ortie ( <i>Veronica urticifolia</i> ), sceau de Salomon verticille ( <i>Polygonatum vercillatum</i> )	<b>Herbeux. Calamagrostide bigarrée, laiche glauque.</b> <b>Basique, à humidité variable:</b> calamagrostide bigarrée ( <i>Calamagrostis varia</i> ), laiche glauque ( <i>Carex flacca</i> ), gentiane à feuilles d'asclépiade ( <i>Gentiana asclepiadea</i> ), centaurée des montagnes ( <i>Centaurea montana</i> ), fausse pâquerette ( <i>Aster bellidiastrum</i> ) <b>Basique:</b> adénostyle glabre ( <i>Adenostyles glabra</i> ), mercuriale vivace ( <i>Mercurialis perennis</i> ) peu fréquente, valériane triséquée ( <i>Valeriana tripteris</i> ) <b>Moyen:</b> prénanthe pourpre ( <i>Prenanthes purpurea</i> ), véronique à feuilles d'ortie ( <i>Veronica urticifolia</i> ), gaillet odorant ( <i>Galium odoratum</i> ), sceau de Salomon verticille ( <i>Polygonatum vercillatum</i> ) <b>Humide:</b> pétasite blanc ( <i>Petasites albus</i> )
<b>Profil idéalisé du peuplement</b>		