

	<p>18v Hêtraie à Sapin avec Calamagrostide bigarrée et Laiche ferrugineuse <i>Adenostylo glabrae Abieti-Fagetum calamagrostietosum variae</i>, <i>formation à Carex ferruginea</i></p>	<p>19 Hêtraie à Sapin avec Luzule des forêts <i>Luzulo-Abieti-Fagetum typicum</i></p>
Forêt naturelle	Le hêtre domine, accompagné du sapin, de l'épicéa, de l'érable sycomore, du frêne, du sorbier des oiseleurs, de l'alisier blanc et d'essences pionnières. Degré de fermeture entrouvert à clairié, parfois arbres rabougris. Arbres isolés et petits collectifs.	Le hêtre et le sapin dominant, accompagnés de l'épicéa, du sorbier des oiseleurs et d'essences pionnières. Degré de fermeture normal à entrouvert. Arbres isolés et petits collectifs.
Hauteur max. du peuplement	10 à 20 m	25 à 35 m
Ecorégion	Plateau, Alpes externes et intermédiaires du Nord (M, 1, 2a)	Plateau, Alpes externes du Nord (M, 1), plus rarement Jura et Alpes intermédiaires du Nord (J, 2a)
Station: données générales	Humidité variable, stations fraîches, riches en bases, souvent terrain instable. En général pentes raides, souvent influencées par les mouvements de la neige.	Substrat acide (pentes et éminences) ou crêtes acidifiées.
Sol: Forme d'humus	Mull, moder, en partie érodé, par endroits mull calcique.	Moder, par endroits mull.
Développement	Rendzine, pararendzine, par endroits sol brut rocheux.	Sol brun, par endroits ranker, régosol.
Caractéristiques	Pierrosité moyenne à très forte, sol superficiel, perméabilité très ralentie à normale, engorgement moyen à nul.	Pierrosité faible à forte, profondeur moyenne, perméabilité normale à légèrement ralentie, engorgement faible à nul.
Végétation: aspect et espèces fréquentes	<p>Herbeux. Laiche ferrugineuse, calamagrostide bigarrée. Basique, à humidité variable: laiche ferrugineuse (<i>Carex ferruginea</i>), calamagrostide bigarrée (<i>Calamagrostis varia</i>), laiche glauque (<i>Carex flacca</i>), gentiane à feuilles d'asclépiade (<i>Gentiana asclepiadea</i>), centaurée des montagnes (<i>Centaurea montana</i>), fausse pâquerette (<i>Aster bellidiastrum</i>)</p> <p>Basique: adénostyle glabre (<i>Adenostyles glabra</i>), mercuriale vivace (<i>Mercurialis perennis</i>) peu fréquente, valériane triséquée (<i>Valeriana tripteris</i>)</p> <p>Moyen: prénanthe pourpre (<i>Prenanthes purpurea</i>), véronique à feuilles d'ortie (<i>Veronica urticifolia</i>), sceau de Salomon verticille (<i>Polygonatum vercillatum</i>)</p> <p>Humide: pétasite blanc (<i>Petasites albus</i>)</p>	<p>Strate herbacée souvent clairsemée. Luzule des forêts ou blanc-de-neige, myrtille.</p> <p>Acide: luzule des forêts (<i>Luzula sylvatica</i>), luzule blanc-de-neige (<i>Luzula nivea</i>), myrtille (<i>Vaccinium myrtillus</i>), blechnum en épi (<i>Blechnum spicant</i>), dryoptéris dilatée (<i>Dryopteris dilatata</i>), laiche à pilules (<i>Carex pilulifera</i>), mousses indicatrices d'acidité</p> <p>Acide en surface: grande fétuque (<i>Festuca altissima</i>) peu fréquente, oxalis petite oseille (<i>Oxalis acetosella</i>)</p> <p>Moyen: prénanthe pourpre (<i>Prenanthes purpurea</i>), véronique à feuilles d'ortie (<i>Veronica urticifolia</i>), fougère femelle (<i>Athyrium filix-femina</i>), dryoptéris fougère mâle (<i>Dryopteris filix-mas</i>), gaillet odorant (<i>Galium odoratum</i>), lamier des montagnes (<i>Lamium galeobdolon ssp. montanum</i>), sceau de Salomon verticille (<i>Polygonatum vercillatum</i>)</p>
Profil idéalisé du peuplement		