

10.8 Sapinières de l'étage montagnard inférieur

	46t Pessière-Sapinière à Bazzania <i>Bazzanio-Abietetum</i>
Forêt naturelle	Pessière-sapinière avec hêtres, chênes et sorbiers des oiseleurs dans le peuplement accessoire. Essences pionnières.
Hauteur max. du peuplement	28 à 35 m
Ecorégion	Plateau (M), Alpes externes du Nord (1), montagnard inférieur
Station: données générales	Stations plates ou légèrement inclinées sur substrat acide.
Sol: Forme d'humus	Humus brut ou moder, parfois variantes humides.
Développement	Pseudogley, sols bruns lessivés mouillés.
Caractéristiques	Profondeur moyenne, perméabilité entravée, engorgement moyen.
Végétation: aspect et espèces fréquentes	La myrtille et les mousses dominant, fougères toujours présentes. Acide: myrtille (<i>Vaccinium myrtillus</i>), luzule des forêts (<i>Luzula sylvatica</i>), blechnum en épi (<i>Blechnum spicant</i>), fougère aigle (<i>Pteridium aquilinum</i>), laiche à pilules (<i>Carex pilulifera</i>), véronique officinale (<i>Veronica officinalis</i>), dryoptéris dilaté (<i>Dryopteris dilatata</i>), maïanthème à deux feuilles (<i>Majanthemum bifolium</i>), lycopode sélagine (<i>Huperzia selago</i>), mousses indicatrices d'acidité Acide en surface: thuidie à feuilles de tamaris (<i>Thuidium tamariscinum</i>), oxalis petite oseille (<i>Oxalis acetosella</i>) Acide, humide: plagiathécie ondulée (<i>Plagiothecium undulatum</i>) Végétation pionnière: ronces (<i>Rubus sp.</i>), fougère aigle
Profil idéalisé du peuplement	