

	12S Hêtraie à Dentaire avec Epiaire des forêts <i>Mercuriali-/Cardamino-Fagetum circaetosum / allietosum</i>	12e Hêtraie à Dentaire avec Laiche blanche <i>Mercuriali-/Cardamino-Fagetum caricetosum albae</i>
Forêt naturelle	Hêtraie mélangée de très bonne croissance avec sapin, érable sycomore et frêne en mélange. Pas de chêne, charme ni merisier; essences pionnières.	Hêtraie de croissance moyenne avec alisier blanc, pin sylvestre et parfois if. Pas de chêne, charme ni merisier. Trop sec pour le sapin; essences pionnières.
Hauteur max. du peuplement	30 à 40 m	18 à 25 m
Ecorégion	Jura (J, vallées), Plateau (M), Alpes externes du Nord (1).	Jura (J), Plateau (M), Alpes externes du Nord (1).
Station: données générales	Pied de versant et fond de vallées, versants ombragés dans les stations basses, calcaire.	Versants secs, surtout exposés au sud, calcaire.
Sol: Forme d'humus	Mull.	Mull, (mull calcique), par endroits xérique.
Développement	Rendzine légèrement engorgée ou régosol légèrement engorgé, parfois brunifié.	Rendzine.
Caractéristiques	Pierrosité faible à moyenne, profondeur moyenne à grande, très calcaire, activité biologique intense, perméabilité normale à légèrement ralentie, engorgement faible à moyen.	Très pierreux, profondeur moyenne à grande, très calcaire, perméabilité normale à extrême.
Végétation: aspect et espèces fréquentes	Herbeux. Fougères souvent abondantes. Humide: laiche à épis pendants (<i>Carex pendula</i>), épiaire des forêts (<i>Stachys sylvatica</i>), impatiente (<i>Impatiens sp.</i>), herbe aux goutteux (<i>Aegopodium podagraria</i>), circée de Paris (<i>Circaea lutetiana</i>) Basique: gouet (<i>Arum maculatum</i>), mercuriale vivace (<i>Mercurialis perennis</i>) Basique, humide: souvent ail des ours (<i>Allium ursinum</i>) Très basique (calcaire): dentaire à sept folioles (<i>Cardamine heptaphylla</i>), gesse printanière (<i>Lathyrus vernus</i>), asaret d'Europe (<i>Asarum europaeum</i>), hellébore fétide (<i>Helleborus foetidus</i>), lis martagon (<i>Lilium martagon</i>), actée en épi (<i>Actaea spicata</i>) Moyen: lamier des montagnes (<i>Lamium galeobdolon ssp. montanum</i>), laiche des forêts (<i>Carex sylvatica</i>), fougère femelle (<i>Athyrium filix-femina</i>), reine des bois (<i>Aruncus dioicus</i>), dryoptéris fougère mâle (<i>Dryopteris filix-mas</i>) Humidité moyenne à forte, argileux: primevère élevée (<i>Primula elatior</i>), sanicle d'Europe (<i>Sanicula europaea</i>)	Souvent pelouses herbeuses et de laiches. Basique, sec: laiche blanche (<i>Carex alba</i>), épipactis pourpre noirâtre (<i>Epipactis atrorubens</i>), céphalanthère rouge et céphalanthère à longues feuilles (<i>Cephalanthera rubra/longifolia</i>), hippocrepide éméru (<i>Hippocrepis emerus</i>), dompte-venin officinal (<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>) Basique, assez sec: mélitte à feuilles de mélisse (<i>Melittis melissophyllum</i>), hépatique à trois lobes (<i>Hepatica nobilis</i>) Basique: mercuriale vivace (<i>Mercurialis perennis</i>) Très basique (calcaire): dentaire à sept folioles (<i>Cardamine heptaphylla</i>), gesse printanière (<i>Lathyrus vernus</i>), hellébore fétide (<i>Helleborus foetidus</i>)
Profil idéalisé du peuplement		