

	<b>12w Hêtraie à Dentaire avec Laiche glauque</b> <i>Mercuriali-/Cardamino-Fagetum caricetosum flaccae</i>	<b>13a Hêtraie à Tilleul typique</b> <i>Tilio-Fagetum typicum</i>
<b>Forêt naturelle</b>	Hêtraie avec érable sycomore, tilleul à grandes feuilles et parfois if; essences pionnières.	Le hêtre domine et le tilleul et l'érable sycomore jouent un rôle important; ils sont accompagnés du frêne et d'essences pionnières.
<b>Hauteur max. du peuplement</b>	20 à 30 m	20 à 30 m
<b>Ecorégion</b>	Jura (J), Plateau (M), Alpes externes du Nord (1).	Jura (J), Plateau (M), Alpes externes du Nord (1), aussi étage submontagnard.
<b>Station: données générales</b>	<b>Pentes à éboulis calcaires assez actif, le plus souvent marneux; exposition nord (étage submontagnard) à sud.</b>	<b>Pentes à éboulis calcaires assez actif, frais; exposition nord (étage submontagnard) à sud.</b>
<b>Sol: Forme d'humus</b>	Mull (mull calcique).	Mull (mull calcique).
<b>Développement</b>	Rendzine, en partie brunifiée.	Rendzine, sol brut rocheux.
<b>Caractéristiques</b>	Humidité et sécheresse périodiques, pierrosité faible à moyenne, profondeur moyenne à faible, très calcaire, activité biologique intense, perméabilité normale à légèrement ralentie.	Eboulis calcaires riche en humus; forte pierrosité, profondeur moyenne à grande, activité biologique intense, perméabilité normale à extrême.
<b>Végétation: aspect et espèces fréquentes</b>	<b>Souvent pelouses herbeuses et de laiches.</b> <b>Humidité et sécheresse périodiques:</b> laiche glauque ( <i>Carex flacca</i> ) (pelouse), troène vulgaire ( <i>Ligustrum vulgare</i> ) (peu élevé), plus rarement calamagrostide bigarrée ( <i>Calamagrostis varia</i> ) <b>Basique, sec:</b> laiche blanche ( <i>Carex alba</i> ), épipactis pourpre noirâtre ( <i>Epipactis atrorubens</i> ), céphalanthère rouge et céphalanthère à longues feuilles ( <i>Cephalanthera rubra/longifolia</i> ), hippocrepide émêrus ( <i>Hippocrepis emerus</i> ), dompte-venin officinal ( <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> ) <b>Basique, assez sec:</b> Jura: mélitte à feuilles de mélisse ( <i>Melittis melissophyllum</i> ) <b>Basique:</b> mercuriale vivace ( <i>Mercurialis perennis</i> ) <b>Très basique (calcaire):</b> dentaire à sept folioles ( <i>Cardamine heptaphylla</i> ), gesse printanière ( <i>Lathyrus vernus</i> ), hellébore fétide ( <i>Helleborus foetidus</i> )	<b>Herbeux. Souvent dominé par la dentaire à sept folioles ou la mercuriale vivace, parfois fougères. Pierres visibles. Blessures sur les troncs des arbres.</b> <b>Très basique (calcaire):</b> dentaire à sept folioles ( <i>Cardamine heptaphylla</i> ), gesse printanière ( <i>Lathyrus vernus</i> ), hellébore fétide ( <i>Helleborus foetidus</i> ), tamier commun ( <i>Tamus communis</i> ) <b>Basique:</b> mercuriale vivace ( <i>Mercurialis perennis</i> ), polystic à aiguillons ( <i>Polystichum aculeatum</i> ) <b>Moyen:</b> gaillet odorant ( <i>Galium odoratum</i> ), lamier des montagnes ( <i>Lamium galeobdolon ssp. montanum</i> ), raiponce en épi ( <i>Phyteuma spicatum</i> ) <b>Basique, éboulis:</b> quelques langues de cerf ( <i>Phyllitis scolopendrium</i> ), moehringie mousse ( <i>Moehringia muscosa</i> )
<b>Profil idéalisé du peuplement</b>		