

	8a Hêtraie à Millet typique <i>Milio-Fagetum typicum</i>	8S Hêtraie à Millet avec Épiaire des forêts <i>Milio-Fagetum stachyetosum sylvaticae</i>
Forêt naturelle	Hêtraie à hautes tiges accompagnée de sapin en mélange avec érable sycomore et frêne; pas de chêne, charme ni merisier; troncs rectilignes; essences pionnières.	Forêt mélangée à hautes tiges avec hêtre accompagné de sapin, érable sycomore et frêne; pas de chêne, charme ni merisier; troncs rectilignes; essences pionnières.
Hauteur max. du peuplement	30 à 40 m	30 à 40 m
Ecorégion	Jura (J, vallées), Plateau (M), Alpes externes du Nord (1), plus rarement Alpes intermédiaires du Nord (2a).	Jura (J, vallées), Plateau (M), Alpes externes du Nord (1).
Station: données générales	Plateaux et versants (à l'exception des pentes raides), versants ombragés dans les stations basses.	Pieds de versants et fonds de vallées, versants ombragés dans les stations basses.
Sol:		
Forme d'humus	Mull, parfois légèrement modérisé.	Mull.
Développement	Sol brun, sol brun lessivé.	Sol brun légèrement engorgé ou sol brun lessivé légèrement engorgé.
Caractéristiques	Pierrosité faible à moyenne, sol profond, acidité faible à moyenne, activité biologique intense, perméabilité normale à légèrement ralentie.	Sol profond, activité biologique intense, zone d'enracinement suffisamment aérée pour le hêtre, perméabilité légèrement à très ralentie, engorgement faible à moyen.
Végétation: aspect et espèces fréquentes	Herbeux à lacuneux. Fougères souvent abondantes. Couvert de ronces souvent dense sous les épicéas. Moyen: gaillard odorant (<i>Galium odoratum</i>), lamier des montagnes (<i>Lamium galeobdolon ssp. montanum</i>), laiche des forêts (<i>Carex sylvatica</i>), fougère femelle (<i>Athyrium filix-femina</i>), millet étalé (<i>Milium effusum</i>), dryoptéris fougère mâle (<i>Dryopteris filix-mas</i>), anémone des bois (<i>Anemone nemorosa</i>), sceau de Salomon multiflore (<i>Polygonatum multiflorum</i>), reine des bois (<i>Aruncus dioicus</i>), lierre (<i>Hedera helix</i>) Acide en surface: grande fétuque (<i>Festuca altissima</i>), oxalis petite oseille (<i>Oxalis acetosella</i>) Plus fréquents sous les épicéas: gaillard à feuilles rondes (<i>Galium rotundifolium</i>), ronces (<i>Rubus sp.</i>)	Herbeux. Fougères souvent abondantes. Humide: laiche à épis pendants (<i>Carex pendula</i>), épiaire des forêts (<i>Stachys sylvatica</i>), impatiente (<i>Impatiens sp.</i>), circée de Paris (<i>Circaea lutetiana</i>), herbe aux goutteux (<i>Aegopodium podagraria</i>) Humidité moyenne à forte, argileux: primevère élevée (<i>Primula elatior</i>), sanicle d'Europe (<i>Sanicula europaea</i>), orge d'Europe (<i>Hordelymus europaeus</i>), séneçon ovale (<i>Senecio ovatus</i>) Moyen: lamier des montagnes (<i>Lamium galeobdolon ssp. montanum</i>), laiche des forêts (<i>Carex sylvatica</i>), fougère femelle (<i>Athyrium filix-femina</i>), millet étalé (<i>Milium effusum</i>), dryoptéris fougère mâle (<i>Dryopteris filix-mas</i>), anémone des bois (<i>Anemone nemorosa</i>), sceau de Salomon multiflore (<i>Polygonatum multiflorum</i>), reine des bois (<i>Aruncus dioicus</i>), lierre (<i>Hedera helix</i>)
Profil idéalisé du peuplement		