


8.2 Ecorégion «Plateau»(M)

Ecogramme Plateau (région M) étage haut-montagnard

Aire principale du sapin



2A

Répartition altitudinale:

Au-dessus de 1200 m d'altitude environ (en général au-dessus de 1300 m)

Station:

Principalement sur substrat favorable aux conifères

Peuplement:

Le sapin et l'épicéa dominant, présence du sorbier des oiseleurs, év. de l'érable sycomore. Structure souvent unifiée. Forte concurrence entre les arbres. Phénotypes de l'épicéa les plus fréquents: rameaux «en brosse» et «en peigne».

Rajeunissement:

Le rajeunissement peut s'étendre de façon continue. Rarement microstations durablement défavorables

Types de stations avec éventail d'essences particulier:

Forêts de feuillus (27*), pineraies de montagne (67, 69, 70)

Hauteur max. du peuplement:

50, 51: 30 à 40 m; 46: 25 à 35 m; 46M: 20 à 35 m; 46*, 49, 60*: 20 à 30 m; 53: 15 à 25 m; 27*: 15 à 20 m; 67, 69, 70: 4 à 15 m

Stations forestières particulières:

23, 24*, 48, 56, 57Bl, 71

Autres types de stations:

Forêt alluviale (32)

Espèces indicatrices:

Espèces pouvant croître à l'étage haut-montagnard, mais qui font généralement défaut à l'étage montagnard supérieur:

Athyrium alpestre (*Athyrium distentifolium*)
Calamagrostide velue (*Calamagrostis villosa*)
Cicerbite des Alpes (*Cicerbita alpina*)
Luzule jaunâtre (*Luzula luzulina*)
Impéatoire (*Peucedanum ostruthium*)
Plagiothécie ondulée (*Plagiothecium undulatum*)
Hypne cimier (*Ptilium crista-castrensis*)

60*

Pessière à Calamagrostide bigarrée
Moder ou mull calciques, régosol, (para)rendzine, parf. hydrom.