


8.6 Ecorégion Alpes intermédiaires du Sud (4)

Ecogramme Alpes intermédiaires du Sud (région 4) étage subalpin supérieur



Répartition altitudinale:

Au-dessus de 1800 m d'altitude (en général 1900 à 2100 m)

Station:

On rencontre aussi bien l'arole que le mélèze dans le haut du Puschlav et du Bergell. Au Tessin et dans le Misox, les aroles sont rares, alors que les mélézins sont très répandus et que la flore et les stations sont très proches des arolières.

Peuplement:

Forêts de mélèzes, accompagné en partie de l'arole, du sorbier des oiseleurs et, de façon disséminée, de l'épicéa.

Rajeunissement:

Les opportunités de rajeunissement sont limitées dans l'espace et dans le temps. Le rajeunissement est dépendant de la chaleur.

Types de stations avec éventail d'essences particulier:

Pineraies de montagne (67, 69, 70)

Hauteur max. du peuplement:

59, 59A, 59J, 59*: 15 à 25 m; 67, 69, 70: 4 à 15 m

Stations forestières particulières:

71

Autres types de stations:

Forêt alluviale (32)

Espèces indicatrices:

Espèces pouvant croître à l'étage subalpin supérieur, mais qui font généralement défaut à l'étage subalpin:

Camarine hermaphrodite (*Empetrum nigrum* sl.)
Genévrier nain (*Juniperus communis* ssp. *nana*)
Chèvrefeuille bleu (*Lonicera caerulea*)
Joubarbe des montagnes (*Sempervivum montanum*)
Airelle à petites feuilles (*Vaccinium gaultherioides*)
Véronique buissonnante (*Veronica fruticans*)