


8.7 Ecorégion Alpes externes du Sud (5)

Ecogramme Alpes externes du Sud (région 5) étage subalpin



Répartition altitudinale:

Env. 1500 à 2000 m d'altitude (en général 1600 à 1900 m)

Station:

Stations fraîches et période de végétation courte. Mosaïque composée de microstations particulièrement nombreuses. Grand nombre d'endroits où les conifères ne peuvent survivre. Tendance à former une épaisse couche organique (humus brut)

Peuplement:

Le mélèze ou le sorbier des oiseleurs dominant. Parfois présence de sapins disséminés. Nombreux buissons nains.

Rajeunissement:

Les opportunités de rajeunissement sont limitées dans l'espace et dans le temps. Le rajeunissement est dépendant de la chaleur.

Types de stations avec éventail d'essences particulier:

Hêtraie (région 5b, 20*), pineraies de montagne (67, 69, 70).

Hauteur max. du peuplement:

47*: 20 à 30 m; 59A, 59J: 15 à 25 m; 20*: 12 à 22 m; 27*: 15 à 20 m; 67, 69, 70: 4 à 15 m, 21*: 6 à 8 m

Stations forestières particulières:

24*

Autres types de stations:

Forêt alluviale (32), buissons d'aulnes verts

Espèces indicatrices:

Espèces pouvant croître à l'étage subalpin, mais qui font généralement défaut à l'étage haut-montagnard:

Genévrier nain (*Juniperus communis* ssp. *nana*)