

	18* Karbonat-Tannen-Buchenwald mit Weisssegge <i>Adenostyle glabrae-Abieti-Fagetum caricetosum albae</i>	18w Typischer Buntreitgras-Tannen-Buchenwald <i>Adenostylo glabrae Abieti-Fagetum calamagrostietosum variae</i>
Naturwald	Buche und Tanne dominieren, dazu Fichte, Bergahorn, Esche, Vogelbeere und Mehlbeere; In den Zwischenalpen (2a) auch Lärche; Pionierbaumarten Schlussgrad locker bis räumig, Einzelbäume, Kleinkollektive, auch Rotten möglich	Buche und Tanne dominieren, dazu Fichte, Bergahorn, Esche, Mehlbeere, Vogelbeere; Pionierbaumarten. Schlussgrad locker bis aufgelöst, Einzelbäume, Kleinkollektive, auch Rotten möglich
Max. Bestandeshöhe	20 - 30 m	15 - 25 m
Standortsregion	Nördliche Zwischenalpen (2a), seltener Jura, Mittelland, nördliche Randalpen (J, M, 1)	Jura, Mittelland, nördliche Rand- und Zwischenalpen (J, M, 1, 2a)
Standort allgemein	Basenreiche Unterlage (v. a. Kalke), flachgründig, oft in felsigen, steilen Lagen, trocken	Wechselfeuchte, basenreiche, oft rutschige Standorte, meistens Steilhänge
Boden	Humusform Mull, stellenweise Kalkmull, Moder, auch trockene Ausprägungen möglich	Mull, Moder, teils erodiert, stellenweise Kalkmull
Entwicklung	Rendzina, stellenweise Pararendzina, Gesteinsrohboden	Rendzina, Pararendzina, stellenweise Braunerde
Eigenschaften	Skelettreich, Gründigkeit mittel, normal bis übermässig durchlässig	Skelettfrei bis -reich, flachgründig, Durchlässigkeit leicht bis stark gehemmt, Vernässung leicht bis keine
Vegetation Aspekt und häufige Arten	Weisssegge und Kahler Alpendost Basisch, trocken: Weisssegge (<i>Carex alba</i>), Schwalbenwurz (<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>) Basisch, wechselfeucht: Schlawfe Segge (<i>Carex flacca</i>) Basisch: Kahler Alpendost (<i>Adenostyles glabra</i>), wenig Bingelkraut (<i>Mercurialis perennis</i>), Dreiblattbaldrian (<i>Valeriana tripteris</i>) Mittel: Hasenlattich (<i>Prenanthes purpurea</i>), Nesselblättriger Ehrenpreis (<i>Veronica urticifolia</i>), Quirlblättriges Salomonssiegel (<i>Polygonatum verticillatum</i>)	Grasig. Buntreitgras, Schlawfe Segge Basisch, wechselfeucht: Buntreitgras (<i>Calamagrostis varia</i>), Schlawfe Segge (<i>Carex flacca</i>), Schwalbenwurz-enzian (<i>Gentiana asclepiadea</i>), Bergflockenblume (<i>Centaurea montana</i>), Alpenmasslieb (<i>Aster bellidiatrum</i>) Basisch: Kahler Alpendost (<i>Adenostyles glabra</i>), wenig Bingelkraut (<i>Mercurialis perennis</i>), Dreiblattbaldrian (<i>Valeriana tripteris</i>) Mittel: Hasenlattich (<i>Prenanthes purpurea</i>), Nesselblättriger Ehrenpreis (<i>Veronica urticifolia</i>), Waldmeister (<i>Galium odoratum</i>), Quirlblättriges Salomonssiegel (<i>Polygonatum verticillatum</i>) Feucht: Weisse Pestwurz (<i>Petasites albus</i>)
Idealisiertes Bestandesprofil		