


Ökogramm Südliche Zwischenalpen (Region 4) collin



Höhenverbreitung: Ca. 300 – 1100 m über Meer (meist 400 – 1000 m)

Standort: Die Bestände sind stark durch menschliche Einflüsse (Kastanie, Niederwald) geprägt.

Bestand: Edellaubbäume wie Winterlinde, Esche, Hopfenbuche; Kastanie

Verjüngung: Flächig möglich;

Standortstypen mit abweichender Baumartenzusammensetzung: Auf flachgründigen, stark besonnten felsigen Standorten: Waldföhrenwälder (68), Eichenwälder (42R, 42C/Q, 42V).

Max. Bestandeshöhe: H = Hochwald, N = Niederwald
25Am-33m: H 25 – 33m, N 20 – 25 m;
25AB-33B: H 25 – 33 m, N 20 – 25 m;
33AV-33A: H 25 – 30 m; N 20 – 25 m;
25AF: H 25 – 30 m, N 20 m; 33-27: H 22 – 26 m, N 20 m;
25A-34m: H 20 – 28 m, N 18 – 24 m;
34B: H 20 – 25 m, N 16 – 20 m; Rob: 15 – 25 m;
42V: H 18 – 24 m, N 12 – 14 m;
(42)-34A: H 17 – 22m, N 10 – 15 m;
42C/Q: H 17 – 22 m, N 10 – 15 m;
68: 10 – 18 m; 42R: 5 – 15 m.

Zusätzliche Standortstypen:
Auenwald (32)

Zeigerpflanzen: Arten, die collin vorkommen können, aber hochmontan meistens fehlen:

Feldahorn (*Acer campestre*)
Bärlauch (*Allium ursinum*)
Aronstab (*Arum maculatum*)
Waldgeißbart (*Aruncus dioecus*)
Waldrebe (*Clematis vitalba*)
Hornstrauch (*Cornus sanguinea*)
Spierstaude (*Filipendula ulmaria*)
Gundelrebe (*Glechoma hederaceum*)
Liguster (*Ligustrum vulgare*)
Vielblütiges Salomonssiegel (*Polygonatum multiflorum*)
Echtes Salomonssiegel (*Polygonatum odoratum*)
Waldziest (*Stachys silvatica*)
Edelgamander (*Teucrium chamaedrys*)
Wolliger Schneeball (*Viburnum lantana*)
Schwalbenwurz (*Vincetoxicum hircundinaria*)