


8.7 Standortsregion Südliche Randalpen (5) Ökogramm Südliche Randalpen (Region 5) subalpin



Höhenverbreitung: Ca. 1500 - 2000 m über Meer (meist 1600 – 1900 m)

Standort: Kühle Lagen mit kurzer Vegetationsperiode; Ausgeprägtes Kleinstandortsmosaik mit vielen Stellen, an denen Nadelbäume nicht gedeihen können. Tendenz zur Bildung von mächtigen organischen Auflagen (Rohhumus)

Bestand: Lärche oder Vogelbeere dominiert, dazu manchmal einige Tannen. Viele Zwergsträucher.

Verjüngung: Verjüngungsgunst ist örtlich und zeitlich beschränkt; die Verjüngung ist wärmeabhängig.

Standortstypen mit abweichender Baumartenzusammensetzung: Buchenwald (Region 5b, 20*), Bergföhrenwälder (67, 69, 70)

Max. Bestandeshöhe: 47*: 20 – 30 m; 59A, 59J: 15 – 25 m; 12*h: 12 – 22 m; 27*: 15 – 20 m; 67, 69, 70: 4 – 15 m, 21*: 6 – 8 m.

Sonderwaldstandorte: 24*

Zusätzliche Standortstypen: Auenwald (32), Grünerlengebüsch

Arten, die subalpin vorkommen können, aber hochmontan meistens fehlen:

Zwergwachholder (*Juniperus communis* ssp. *nana*)