


Ökogramm Südliche Randalpen (Region 5) collin



Höhenverbreitung: Ca. 300 – 1100 m über Meer (meist 400 – 1000 m)

Standort: Die Bestände sind stark durch menschliche Einflüsse (Kastanie, Niederwald) geprägt.

Bestand: Edellaubbäume wie Winterlinde, Esche, Hopfenbuche; Kastanie, Buche, teilweise Tanne

Verjüngung: Flächig möglich

Standortstypen mit abweichender Baumartenzusammensetzung: Auf flachgründigen, stark besonnten felsigen Standorten: Eichenwälder (38*, 42R, 42C/Q, 42V). Mendrisiotto: Hagebuchenmischwald (355)

Max. Bestandeshöhe:

H = Hochwald, N = Niederwald
 355: 25-30m; 25Am-33m: H 25 – 33m, N 20 – 25 m;
 25AB-33B: H 25 – 33 m, N 20 – 25 m;
 33AV-33A: H 25 – 30 m; N 20 – 25 m; 27: 25 – 35 m;
 25AF: H 25 – 30 m, N 20 m;
 3mL-4L: 20 – 33 m; 25B: 20 – 30 m;
 33-27: H 22 – 26 m, N 20 m;
 25A-34m: H 20 – 28 m, N 18 – 24 m;
 34B: H 20 – 25 m, N 16 – 20 m; Rob: 15 – 25 m;
 42V: H 18 – 24 m, N 12 – 14 m;
 (42)-34A: H 17 – 22m, N 10 – 15 m;
 42C/Q: H 17 – 22 m, N 10 – 15 m;
 36: 14 – 25 m; 3VL: 15 – 20 m; 37, 38*: 9 – 18 m; 42R: 5 – 15 m.

Sonderwaldstandorte:

23* (Region 5a), 25B

Zusätzliche Standortstypen:

Auenwälder (28, 29, 30, 66)

Zeigerpflanzen:

Arten, die collin vorkommen können, aber montan meistens fehlen:

Feldahorn (*Acer campestre*)
 Bärlauch (*Allium ursinum*)
 Aronstab (*Arum maculatum*)
 Waldgeißbart (*Aruncus dioecus*)
 Waldrebe (*Clematis vitalba*)
 Hornstrauch (*Cornus sanguinea*)
 Spierstaude (*Filipendula ulmaria*)
 Gundelrebe (*Glechoma hederaceum*)
 Liguster (*Ligustrum vulgare*)
 Vielblütiges Salomonssiegel (*Polygonatum multiflorum*)
 Echtes Salomonssiegel (*Polygonatum odoratum*)
 Waldziest (*Stachys silvatica*)
 Edelgamander (*Teucrium chamaedrys*)
 Wolliger Schneeball (*Viburnum lantana*)
 Stechpalme baumförmig (*Ilex aquifolium*)
 Eibe (*Taxus baccata*)
 Mäusedorn (*Ruscus aculeatus*)
 Spitzer Streifenfarn (*Asplenium onopteris*)
 Hanfpalme (*Trachycarpus fortunei*)
 Kirschlorbeer (*Prunus laurocerasus*)
 Edellorbeer (*Laurus nobilis*)