





## 10.12 Forêts feuillues de l'étage collinéen des Alpes externes du Nord et intermédiaires

	25e Tillaie à Frêne sur roche <i>Tilio-Fraxinetum</i>	35A Chênaie à Gouet <i>Stellario-Carpinetum</i>
<b>Forêt naturelle</b>	Frênaie mélangée peu fertile, souvent buissonnante avec tilleuls et chênes isolés. Essences pionnières.	Forêt de feuillus fertile avec chênes (surtout chêne pédonculé), charme, frêne, tilleul à grandes feuilles, merisier, érable champêtre et, par pieds isolés, érable sycomore et hêtre. Essences pionnières.
<b>Hauteur max. du peuplement</b>	10 à 20 m	25 à 35 m
<b>Ecorégion</b>	Jura (J), Alpes externes du Nord (1); collinéen à submontagnard.	Plateau (M): secteur occidental, région de Bâle et de Schaffhouse, collinéen.
<b>Station: données générales</b>	<b>Versants abrupts secs sur calcaire.</b>	<b>Stations plates sur sol périodiquement humide ou sec; humidité au printemps; régions à précipitations plutôt faibles (moins de 900 mm/an).</b>
<b>Sol:</b>		
<b>Forme d'humus</b>	Xéromull (xéromull calcaire) et xéromoder.	Mull.
<b>Développement</b>	Rendzine très superficielle.	Sol brun lessivé avec légère tendance au pseudogley (saturation périodique).
<b>Caractéristiques</b>	Souvent limité aux fissures de rochers, perméabilité excessive.	Granulation fine à argileuse, humide au printemps, à sécheresse périodique en été avec des épisodes de fort assèchement, présence de bases et souvent de calcaire.
<b>Végétation: aspect et espèces fréquentes</b>	<b>Buissonnant et herbeux.</b> <b>Basique, sec:</b> séslerie bleuâtre ( <i>Sesleria caerulea</i> ), laser à larges feuilles ( <i>Laserpitium latifolium</i> ), hippocrépide éméрус ( <i>Hippocrepis emerus</i> ), dompte-venin officinal ( <i>Vincetoxicum hircundinaria</i> ) <b>Sec:</b> campanule à feuilles rondes ( <i>Campanula rotundifolia</i> ), silène penché ( <i>Silene nutans</i> ) <b>Très sec:</b> germandrée petit chêne ( <i>Teucrium chamaedrys</i> ), bois de Sainte Lucie ( <i>Prunus mahaleb</i> ), laiche humble ( <i>Carex humilis</i> )	<b>Herbeux au printemps, moins herbeux en été.</b> <b>Moyen:</b> gaillet odorant ( <i>Galium odoratum</i> ), lamier des montagnes ( <i>Lamium galeobdolon ssp. montanum</i> ), laiche des forêts ( <i>Carex sylvatica</i> ), raiponce en épis ( <i>Phyteuma spicatum</i> ), fougère femelle ( <i>Athyrium filix-femina</i> ), véronique à feuilles d'ortie ( <i>Veronica urticifolia</i> ), millet étalé ( <i>Milium effusum</i> ), fougère mâle ( <i>Dryopteris filix-mas</i> ) <b>Basique:</b> cornouiller sanguin ( <i>Cornus sanguinea</i> ), viorne latane ( <i>Viburnum lantana</i> ), érable champêtre ( <i>Acer campestre</i> ), troène commun ( <i>Ligustrum vulgare</i> ), clématite blanche ( <i>Clematis vitalba</i> ), pulmonaire ( <i>Pulmonaria obscura und officinalis</i> ) <b>Basique, frais:</b> gouet ( <i>Arum maculatum</i> ) <b>Moyen:</b> gaillet odorant ( <i>Galium odoratum</i> ), lamier des montagnes ( <i>Lamium galeobdolon ssp. montanum</i> ), anémone des bois ( <i>Anemone nemorosa</i> ), laiche des forêts ( <i>Carex sylvatica</i> ) <b>Humide:</b> ficaire ( <i>Ranunculus ficaria</i> ) <b>Humide, basique:</b> lierre terrestre ( <i>Glechoma hederacea sl.</i> ), muscatelle ( <i>Adoxa moschatellina</i> )
<b>Profil idéalisé du peuplement</b>		

	35 Charmaie à Gaillet des bois <i>Galio-Carpinetum</i>	38 Chênaie à Arabette tourette <i>Arabidi turritae-Quercetum pubescentis</i>
<b>Forêt naturelle</b>	Forêt de feuillus avec chênes, charme, merisier, érable champêtre, alisier blanc, tilleul à grandes feuilles et, par pieds isolés uniquement, hêtre. Essences pionnières.	Chênaie peu fertile, souvent entrouverte avec chênes sessile et pubescent, alisier blanc, érable à feuilles d'obier, alisier torminal, poirier sauvage. Essences pionnières.
<b>Hauteur max. du peuplement</b>	25 à 35 m	7 à 15 m
<b>Ecorégion</b>	Plateau (M): régions de Genève, Bâle, Schaffhouse, collinéen.	Jura (J), partie occidentale jusqu'à la région de Bienne, collinéen et submontagnard.
<b>Station: données générales</b>	<b>Stations plates avec sol humide au printemps et sec en été, p. ex. dans les endroits à gel tardif ou à précipitations plutôt faibles (moins de 900 mm/an).</b>	<b>Versants secs de rochers calcaires exposés au sud, stations chaudes.</b>
<b>Sol: Forme d'humus</b>	Mull.	Xéromull.
<b>Développement</b>	Sol brun lessivé.	Rendzine, régosol, parfois brunifié.
<b>Caractéristiques</b>	Humide au printemps, très asséché en été, souvent pierreux, mais avec beaucoup de terre fine, souvent sans calcaire.	Superficiel, sec.
<b>Végétation: aspect et espèces fréquentes</b>	<p><b>Développement de la strate herbacée très variable. Combinaison caractéristique de quelques espèces printanières indicatrices de fraîcheur avec des espèces indicatrices de sécheresse, d'acidité et de bases.</b></p> <p><b>Acide, sec:</b> luzule des bosquets (<i>Luzula luzuloides</i>), gesse à feuilles étroites (<i>Lathyrus linifolius</i>), mélampyre des prés (<i>Melampyrum pratense</i>), gesse des montagnes (<i>Lathyrus linifolius</i>)</p> <p><b>Modérément sec:</b> laiche des montagnes (<i>Carex montana</i>), laiche digitée (<i>Carex digitata</i>)</p> <p><b>Basique, sec:</b> muguet (<i>Convallaria majalis</i>), laiche blanche (<i>Carex alba</i>)</p> <p><b>Basique, modérément sec:</b> mélitte à feuilles de mélisse (<i>Mellitis melissophyllum</i>), mélique penchée (<i>Melica nutans</i>)</p> <p><b>Basique:</b> cornouiller sanguin (<i>Cornus sanguinea</i>), viorne lantane (<i>Viburnum lantana</i>), érable champêtre (<i>Acer campestre</i>), troène commun (<i>Ligustrum vulgare</i>), pulmonaire (<i>Pulmonaria obscura et officinalis</i>)</p> <p><b>Moyen:</b> anémone des bois (<i>Anemone nemorosa</i>), raiponce en épi (<i>Phyteuma spicatum</i>)</p>	<p><b>Sous-étage riche en espèces, herbes ou graminées.</b></p> <p><b>Très sec:</b> anthéricum à fleurs de lis (<i>Anthericum liliago</i>), germandrée petit chêne (<i>Teucrium chamaedrys</i>), laiche humble (<i>Carex humilis</i>), saponaire rose (<i>Saponaria ocymoides</i>), peucedan des montagnes (<i>Peucedanum oreoselinum</i>), peucedan cervaire (<i>Peucedanum cervaria</i>), bois de Sainte-Lucie (<i>Prunus mahaleb</i>), amélanchier à feuilles ovales (<i>Amelanchier ovalis</i>)</p> <p><b>Sec:</b> sceau de Salomon officinal (<i>Polygonatum odoratum</i>), géranium sanguin (<i>Geranium sanguineum</i>), campanule à feuilles rondes (<i>Campanula rotundifolia</i>), primevère de Colonna (<i>Primula veris</i> ssp. <i>columnae</i>), silène penché (<i>Silene nutans</i> ssp. <i>nutans</i>), trèfle pourpre (<i>Trifolium rubens</i>), trèfle intermédiaire (<i>Trifolium medium</i>)</p> <p><b>Basique, sec:</b> seslérie bleuâtre (<i>Sesleria caerulea</i>), laser à larges feuilles (<i>Laserpitium latifolium</i>), anthéricum rameux (<i>Anthericum ramosum</i>), épipactis pourpre noirâtre (<i>Epipactis atrorubens</i>), céphalanthère rouge (<i>Cephalanthera rubra</i>), céphalanthère à longues feuilles (<i>Cephalanthera longifolia</i>), hippocrepide émerus (<i>Hippocrepis emerus</i>), brachypode penné (<i>Brachypodium pinnatum</i>), dompte-venin officinal (<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>), marjolaine sauvage (<i>Origanum vulgare</i>)</p> <p><b>Basique, modérément sec:</b> mélitte à fleurs de mélisse (<i>Mellitis melissophyllum</i>), mélique penchée (<i>Melica nutans</i>), hépatique à trois lobes (<i>Hepatica nobilis</i>)</p> <p><b>Basique:</b> cornouiller sanguin (<i>Cornus sanguinea</i>), viorne lantane (<i>Viburnum lantana</i>), érable champêtre (<i>Acer campestre</i>), troène commun (<i>Ligustrum vulgare</i>)</p> <p><b>Très basique (calcaire):</b> gesse printanière (<i>Lathyrus vernus</i> ssp. <i>vernus</i>), hellébore fétide (<i>Helleborus foetidus</i>)</p> <p><b>Sécheresse périodique, basique:</b> laiche glauque (<i>Carex flacca</i>)</p>
<b>Profil idéalisé du peuplement</b>		

	<b>38S Chênaie à Saponaire</b> <i>Saponario-Quercetum pubescentis</i>	<b>39 Chênaie à Coronille en couronne</b> <i>Coronillo coronatae-Quercetum</i>
<b>Forêt naturelle</b>	Chênaie peu fertile avec chêne pubescent, chêne sessile, alisier blanc, érable à feuille d'obier, pin sylvestre. Essences pionnières.	Chênaie mélangée fertile avec chêne sessile, chêne pubescent, alisier blanc, alisier torminal, érable champêtre, frêne, poirier sauvage, pin sylvestre. Essences pionnières.
<b>Hauteur max. du peuplement</b>	5 à 12 m	8 à 16 m
<b>Ecorégion</b>	Vallée du Rhône valaisanne (2), collinéen et submontagnard.	Jura (J, Schaffhouse, collinéen à montagnard inférieur), Plateau (M, région de Schaffhouse).
<b>Station: données générales</b>	<b>Versants secs (rochers ou éboulis de pente) dans les stations chaudes des régions sèches du Valais.</b>	<b>Versants de rochers calcaires secs exposés au sud.</b>
<b>Sol:</b>		
<b>Forme d'humus</b>	Xéromull.	Xéromull.
<b>Développement</b>	Rendzine.	Rendzine, régosol, parfois brunifié.
<b>Caractéristiques</b>	Très sec, en général riche en bases.	Superficiel, sec.
<b>Végétation: aspect et espèces fréquentes</b>	<p><b>Sous-étage riche en espèces, tapis de graminées ou d'herbes.</b></p> <p><b>Très sec:</b> orpin grand (<i>Sedum telephium</i> ssp. <i>maximum</i>), anthéricum à fleurs de lis (<i>Anthericum liliago</i>), germandrée petit chêne (<i>Teucrium chamaedrys</i>), laiche humble (<i>Carex humilis</i>), saponaire rose (<i>Saponaria ocymoides</i>), peucedan des montagnes (<i>Peucedanum oreoselinum</i>), asperge à feuilles étroites (<i>Asparagus tenuifolius</i>), bois de Sainte Lucie (<i>Prunus mahaleb</i>), amélanchier à (<i>Amelanchier ovalis</i>)</p> <p><b>Sec:</b> raisin d'ours commun (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>), paturin des bois (<i>Poa nemoralis</i>), sceau de Salomon officinal (<i>Polygonatum odoratum</i>), géranium sanguin (<i>Geranium sanguineum</i>), campanule à feuilles rondes (<i>Campanula rotundifolia</i>), silène penché (<i>Silene nutans</i> ssp. <i>nutans</i>)</p> <p><b>Basique, sec:</b> céphalanthère à longues feuilles (<i>Cephalanthera longifolia</i>), hippocrepide émerus (<i>Hippocrepis emerus</i>), brachypode penné (<i>Brachypodium pinnatum</i>), dompte-venin officinal (<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>), épipactis pourpre noirâtre (<i>Epipactis atrorubens</i>)</p> <p><b>Basique, modérément sec:</b> hépatique à trois lobes (<i>Hepatica nobilis</i>)</p> <p><b>Basique:</b> cornouiller sanguin (<i>Cornus sanguinea</i>), viorne lantane (<i>Viburnum lantana</i>), érable champêtre (<i>Acer campestre</i>), troène vulgaire (<i>Ligustrum vulgare</i>)</p>	<p><b>Sous-étage riche en espèces, tapis de graminées ou d'herbes.</b></p> <p><b>Très sec:</b> germandrée petit chêne (<i>Teucrium chamaedrys</i>), laiche humble (<i>Carex humilis</i>), peucedan des montagnes (<i>Peucedanum oreoselinum</i>), peucedan cervaire (<i>Peucedanum cervaria</i>), bois de Sainte-Lucie (<i>Prunus mahaleb</i>), amélanchier à feuilles ovales (<i>Amelanchier ovalis</i>)</p> <p><b>Sec:</b> sceau de Salomon officinal (<i>Polygonatum odoratum</i>), géranium sanguin (<i>Geranium sanguineum</i>), campanule à feuilles rondes (<i>Campanula rotundifolia</i>), primevère de Colonna (<i>Primula veris</i> ssp. <i>columnae</i>), silène penché (<i>Silene nutans</i> ssp. <i>nutans</i>), coronille en couronne (<i>Coronilla coronata</i>), trèfle pourpre (<i>Trifolium rubens</i>), trèfle intermédiaire (<i>Trifolium medium</i>)</p> <p><b>Basique, sec:</b> seslérie bleuâtre (<i>Sesleria caerulea</i>), chardon décapité (<i>Carduus defloratus</i>, ssp. <i>defloratus</i>), laser à larges feuilles (<i>Laserpitium latifolium</i>), anthéricum rameux (<i>Anthericum ramosum</i>), laiche blanche (<i>Carex alba</i>), buphtalme à feuilles de saule (<i>Buphtalmum salicifolium</i>), épipactis pourpre noirâtre (<i>Epipactis atrorubens</i>), céphalanthère rouge (<i>Cephalanthera rubra</i>), céphalanthère à longues feuilles (<i>Cephalanthera longifolia</i>), hippocrepide émerus (<i>Hippocrepis emerus</i>), brachypode penné (<i>Brachypodium pinnatum</i>), dompte-venin officinal (<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>), marjolaine sauvage (<i>Origanum vulgare</i>)</p> <p><b>Basique, modérément sec:</b> mélitte à feuilles de mélisse (<i>Melitis melissophyllum</i>), mélique penchée (<i>Melica nutans</i>), hépatique à trois lobes (<i>Hepatica nobilis</i>), tanaïsie en corymbe (<i>Tanacetum corymbosum</i>)</p> <p><b>Basique:</b> cornouiller sanguin (<i>Cornus sanguinea</i>), viorne lantane (<i>Viburnum lantana</i>), érable champêtre (<i>Acer campestre</i>), troène commun (<i>Ligustrum vulgare</i>)</p> <p><b>Très basique (calcaire):</b> gesse printanière (<i>Lathyrus vernus</i> ssp. <i>vernus</i>), hellébore fétide (<i>Helleborus foetidus</i>)</p> <p><b>Sécheresse périodique, basique:</b> laiche glauque (<i>Carex flacca</i>)</p>
<b>Profil idéalisé du peuplement</b>		

	39* Chênaie à Nerprun des Alpes <i>Rhamno alpinae-Quercetum</i>	40* Chênaie à Germandrée <i>Teucrio-Quercetum</i>
<b>Forêt naturelle</b>	Chênaie mélangée peu fertile avec chêne sessile, alisier blanc, tilleul à grandes feuilles, érable champêtre, érable à feuilles d'obier, poirier sauvage. Essences pionnières.	Chênaie mélangée fertile avec chêne sessile, alisier blanc, pin sylvestre. Essences pionnières.
<b>Hauteur max. du peuplement</b>	8 à 16 m	10 à 15 (20) m
<b>Ecorégion</b>	Jura (J sans Schaffhouse), montagnard inférieur à l'ouest, collinéen et montagnard inférieur au nord et à l'est.	Alpes externes du Nord (1), Alpes intermédiaires du Nord avec présence du hêtre (2a), Alpes intermédiaires du Nord sans le hêtre (2b Domleschg GR), collinéen à montagnard inférieur.
<b>Station: données générales</b>	<b>Versants de rochers calcaires secs exposés au sud.</b>	<b>Versants de rochers calcaires secs exposés au sud dans les vallées à fœhn.</b>
<b>Sol:</b>		
<b>Forme d'humus</b>	Xéromull.	Xéromoder.
<b>Développement</b>	Rendzine, Régosol, parfois brunifié.	Rendzine, régosol, parfois brunifié.
<b>Caractéristiques</b>	Superficiel, sec.	Superficiel, sec.
<b>Végétation: aspect et espèces fréquentes</b>	<p><b>Sous-étage riche en espèces, herbes ou graminées.</b>  <b>Très sec:</b> germandrée petit chêne (<i>Teucrium chamaedrys</i>), laiche humble (<i>Carex humilis</i>), peucedan des montagnes (<i>Peucedanum oreoselinum</i>), peucedan cervaire (<i>Peucedanum cervaria</i>), bois de Sainte Lucie (<i>Prunus mahaleb</i>), amélanchier à feuilles ovales (<i>Amelanchier ovalis</i>)  <b>Sec:</b> sceau de Salomon officinal (<i>Polygonatum odoratum</i>), géranium sanguin (<i>Geranium sanguineum</i>), campanule à feuilles rondes (<i>Campanula rotundifolia</i>), primevère de Colonna (<i>Primula veris</i> ssp. <i>columnae</i>), silène penché (<i>Silene nutans</i> ssp. <i>nutans</i>), trèfle pourpre (<i>Trifolium rubens</i>), trèfle intermédiaire (<i>Trifolium medium</i>)  <b>Basique, sec:</b> séslerie bleuâtre (<i>Sesleria caerulea</i>), chardon décapité (<i>Carduus defloratus</i>, ssp. <i>defloratus</i>), laser à larges feuilles (<i>Laserpitium latifolium</i>), anthéricum rameux (<i>Anthericum ramosum</i>), laiche blanche (<i>Carex alba</i>), buphtalme à feuilles de saule (<i>Buphtalmum salicifolium</i>), épipactis pourpre noirâtre (<i>Epipactis atrorubens</i>), céphalanthère rouge (<i>Cephalanthera rubra</i>), céphalanthère à longues feuilles (<i>Cephalanthera longifolia</i>), hippocrépide éméris (<i>Hippocrepis emerus</i>), brachypode penné (<i>Brachypodium pinnatum</i>), odmpete-venin officinal (<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>), marjolaine sauvage (<i>Origanum vulgare</i>), nerprun des Alpes (<i>Rhamnus alpina</i>)  <b>Basique, modérément sec:</b> mélisse à feuilles de mélisse (<i>Melitis melissophyllum</i>), mélisse penchée (<i>Melica nutans</i>), hépatique à trois lobes (<i>Hepatica nobilis</i>), tanaïsie en corymbe (<i>Tanacetum corymbosum</i>)  <b>Basique:</b> cornouiller sanguin (<i>Cornus sanguinea</i>), viorne lantane (<i>Viburnum lantana</i>), érable champêtre (<i>Acer campestre</i>), troène commun (<i>Ligustrum vulgare</i>), daphné lauréole, laurier des bois (<i>Daphne laureola</i>)  Très basique (calcaire): vesse printanière (<i>Lathyrus vernus</i> ssp. <i>vernus</i>), hellébore fétide (<i>Helleborus foetidus</i>)  <b>Sécheresse périodique, basique:</b> laiche glauque (<i>Carex flacca</i>)</p>	<p><b>Sous-étage riche en espèces, avec graminées ou herbes.</b>  <b>Très sec:</b> anthéricum à fleurs de lis (<i>Anthericum liliago</i>), germandrée petit chêne (<i>Teucrium chamaedrys</i>), laiche humble (<i>Carex humilis</i>), peucedan des montagnes (<i>Peucedanum oreoselinum</i>), peucedan cervaire (<i>Peucedanum cervaria</i>), bois de Sainte Lucie (<i>Prunus mahaleb</i>), amélanchier à feuilles ovales, néflier des rochers (<i>Amelanchier ovalis</i>)  <b>Sec:</b> sceau de Salomon médicinal (<i>Polygonatum odoratum</i>), géranium sanguin (<i>Geranium sanguineum</i>), campanule à feuilles rondes (<i>Campanula rotundifolia</i>), silène penché (<i>Silene nutans</i> ssp. <i>nutans</i>), trèfle pourpre (<i>Trifolium rubens</i>), trèfle intermédiaire (<i>Trifolium medium</i>)  <b>Basique, sec:</b> séslerie bleuâtre (<i>Sesleria caerulea</i>), laser à larges feuilles (<i>Laserpitium latifolium</i>), anthéricum rameux (<i>Anthericum ramosum</i>), épipactis pourpre noirâtre (<i>Epipactis atrorubens</i>), céphalanthère rouge (<i>Cephalanthera rubra</i>), céphalanthère à longues feuilles (<i>Cephalanthera longifolia</i>), hippocrépide éméris (<i>Hippocrepis emerus</i>), brachypode penné (<i>Brachypodium pinnatum</i>), dompte-venin officinal (<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>), marjolaine sauvage (<i>Origanum vulgare</i>)  <b>Basique, modérément sec:</b> mélisse à feuilles de mélisse (<i>Melitis melissophyllum</i>), mélisse penchée (<i>Melica nutans</i>), hépatique à trois lobes (<i>Hepatica nobilis</i>)  <b>Basique:</b> cornouiller sanguin (<i>Cornus sanguinea</i>), viorne lantane (<i>Viburnum lantana</i>), érable champêtre (<i>Acer campestre</i>), troène commun (<i>Ligustrum vulgare</i>)  <b>Très basique (calcaire):</b> gesse printanière (<i>Lathyrus vernus</i> ssp. <i>vernus</i>), hellébore fétide (<i>Helleborus foetidus</i>)  <b>Sécheresse périodique, basique:</b> laiche glauque (<i>Carex flacca</i>)</p>
<b>Profil idéalisé du peuplement</b>		

	41 Chênaie à Gesse noire <i>Lathyro-Quercetum</i>	41* Chênaie à Luzule <i>Luzulo-Quercetum</i>
<b>Forêt naturelle</b>	Forêt de feuillus mélangée avec chêne sessile, alisier blanc, alisier torminal. Essences pionnières.	Forêt de feuillus peu fertile avec chêne sessile, alisier blanc, sorbier des oiseleurs. Essences pionnières.
<b>Hauteur max. du peuplement</b>	10 à 15 (20) m	10 à 15 (20) m
<b>Ecorégion</b>	Jura (J) flanc sud, Plateau (M), collinéen et submontagnard.	Alpes externes du Nord (1), Alpes intermédiaires du Nord (2a, 2b, Grisons), rare dans le Jura (J) et le Plateau (M), collinéen à montagnard inférieur.
<b>Station: données générales</b>	<b>Stations chaudes et sèches, fine couche de moraine sur socle calcaire ou grès perméables.</b>	<b>Versants secs exposés au sud sur sol acide.</b>
<b>Sol: Forme d'humus</b>	Xéromoder.	Xéromoder.
<b>Développement</b>	Rendzine brunifiée ou sol brun.	Sol brun acide.
<b>Caractéristiques</b>	Superficiel, sec, couches supérieures acidifiées.	Superficiel sur roche-mère sans calcaire, très sec.
<b>Végétation: aspect et espèces fréquentes</b>	<p><b>Strate herbiveuse de composition variée. A l'ouest avec fragon piquant (<i>Ruscus aculeatus</i>).</b>  <b>Acide:</b> mélisse uniflore (<i>Melica uniflora</i>)  <b>Acide, sec:</b> luzule des bosquets (<b>Luzula luzuloides</b>), gesse des montagnes (<b>Lathyrus linifolius</b>), luzule blanc-de-neige (<i>Luzula nivea</i>), germandrée des bois (<i>Teucrium scorodonia</i>), mélampyre des prés (<i>Melampyrum pratense</i>)  <b>Modérément sec:</b> laiche des montagnes (<i>Carex montana</i>), laiche digitée (<i>Carex digitata</i>), alisier torminal (<i>Sorbus torminalis</i>)  <b>Sec:</b> paturin des bois (<i>Poa nemoralis</i>), sceau de Salomon officinal (<i>Polygonatum odoratum</i>), géranium sanguin (<i>Geranium sanguineum</i>), silène penché (<i>Silene nutans</i> ssp. <i>nutans</i>)  <b>Très sec:</b> germandrée petit chêne (<i>Teucrium chamaedrys</i>)  <b>Basique, sec:</b> anthéricum rameux (<i>Anthericum ramosum</i>), hippocrévide émerus (<i>Hippocrepis emerus</i>), brachypode penné (<i>Brachypodium pinnatum</i>), dompte-venin officinal (<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>), muguet (<i>Convallaria majalis</i>), arabette tourette (<i>Arabis turrita</i>)  <b>Basique, modérément sec:</b> mélitte à feuilles de mélisse (<i>Mellitis melissophyllum</i>), hépatique à trois lobes (<i>Hepatica nobilis</i>)  <b>Très basique (calcaire):</b> gesse printanière (<i>Lathyrus vernus</i> ssp. <i>vernus</i>)  <b>Basique:</b> cornouiller sanguin (<i>Cornus sanguinea</i>), viorne lantane (<i>Viburnum lantana</i>), érable champêtre (<i>Acer campestre</i>), troène commun (<i>Ligustrum vulgare</i>)</p>	<p><b>Herbeux. Dominance fréquente des graminées.</b>  <b>Acide:</b> mélisse uniflore (<i>Melica uniflora</i>)  <b>Acide, sec:</b> callune (fausse bruyère) (<i>Calluna vulgaris</i>), luzule des bosquets (<i>Luzula luzuloides</i>), gesse des montagnes (<i>Lathyrus linifolius</i>), luzule blanc-de-neige (<i>Luzula nivea</i>), germandrée des bois (<i>Teucrium scorodonia</i>), mélampyre des prés (<i>Melampyrum pratense</i>)  <b>Modérément sec:</b> laiche des montagnes (<i>Carex montana</i>), laiche digitée (<i>Carex digitata</i>), alisier torminal (<i>Sorbus torminalis</i>)  <b>Sec:</b> paturin des bois (<i>Poa nemoralis</i>), sceau de Salomon médicinal (<i>Polygonatum odoratum</i>), silène penché (<i>Silene nutans</i> ssp. <i>nutans</i>)  <b>Basique, sec:</b> brachypode penné (<i>Brachypodium pinnatum</i>), muguet (<i>Convallaria majalis</i>)  <b>Basique:</b> viorne lantane (<i>Viburnum lantana</i>), troène (<i>Ligustrum vulgare</i>)</p>
<b>Profil idéalisé du peuplement</b>		