


8.4 Ecorégion Alpes intermédiaires du Nord (2)

Ecogramme Alpes intermédiaires du Nord (région 2) étage subalpin supérieur



Répartition altitudinale:

Au-dessus de 1800 m d'altitude (en général au-dessus de 1900 m)

Station:

Cet étage n'est que peu représenté et a souvent été détruit par le pâturage. Mosaïque caractéristique de nombreuses microstations. Nombreux endroits où les conifères ne peuvent survivre. Climat local froid. Longue durée de l'enneigement. Tendance à former une épaisse couche organique (humus brut)

Peuplement:

Arole avec mélèze, sorbier des oiseaux et l'épicéa par endroit.

Rajeunissement:

Les opportunités de rajeunissement sont limitées dans l'espace et dans le temps. Le rajeunissement est dépendant de la chaleur.

Types de stations avec éventail d'essences particulier:

Pineraies de montagne (67, 69, 70)

Hauteur max. du peuplement:

59, 59A: 15 à 25 m; 59E: 15 à 20 m; 67, 69, 70: 4 à 15 m

Stations forestières particulières:

71

Autres types de stations:

Forêt alluviale (32)

Espèces indicatrices:

Espèces pouvant croître à l'étage subalpin supérieur, mais qui font généralement défaut à l'étage subalpin:

Camarine hermaphrodite (*Empetrum nigrum* sl.)
Genévrier nain (*Juniperus communis* ssp. *nana*)
Chèvrefeuille bleu (*Lonicera caerulea*)
Primevère hérissée (*Primula hirsuta*)
Rhododendron ferrugineux (*Rhododendron ferrugineum*)
Joubarbe des montagnes (*Sempervivum montanum*)
Airelle à petites feuilles (*Vaccinium gaultherioides*)
Véronique buissonnante (*Veronica fruticans*)