


Ecogramme Alpes intermédiaires du Sud (région 4) étage collinéen



Répartition altitudinale:
Env. 300 à 1100 m d'altitude (en général 400 à 1000 m)

Station:
Les peuplements sont fortement influencés par l'homme (châtaigne, taillis).

Peuplement:
feuillus précieux tels que le tilleul à petites feuilles, le frêne, le charme-houblon; châtaignier.

Rajeunissement
Le rajeunissement peut s'étendre de façon continue.

Types de stations avec éventail d'essences particulier:
Stations rocheuses superficielles très ensoleillées: pineraie (68), chênaies (42R, 42C/Q, 42V).

Hauteur max. du peuplement:

F = futaie, T = taillis
25Am-33m: F 25 à 33m, T 20 à 25 m;
25AB-33B: F 25 à 33 m, T 20 à 25 m;
33AV-33A: F 25 à 30 m; T 20 à 25 m;
25AF: F 25 à 30 m, T 20 m;
33-27: F 22 à 26 m, T 20 m;
25A-34m: F 20 à 28 m, T 18 à 24 m;
34B: F 20 à 25 m, T 16 à 20 m;
Rob: 15 à 25 m;
42V: F 18 à 24 m, T 12 à 14 m;
(42)-34A: F 17 à 22m, T 10 à 15 m;
42C/Q: F 17 à 22 m, T 10 à 15 m;
68: 10 à 18 m; 42R: 5 à 15 m

Autres types de stations:
Forêt alluviale (32)

Espèces indicatrices:

Espèces pouvant croître à l'étage collinéen, mais qui font généralement défaut à l'étage montagnard inférieur:

Erable champêtre (*Acer campestre*)
Ail des ours (*Allium ursinum*)
Gouet (*Arum maculatum*)
Reine des bois (*Aruncus dioecus*)
Clématite blanche (*Clematis vitalba*)
Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea*)
Reine des prés (*Filipendula ulmaria*)
Lierre terrestre (*Glechoma hederacea*)
Troène vulgaire (*Ligustrum vulgare*)
Sceau de Salomon multiflore (*Polygonatum multiflorum*)
Sceau de Salomon officinal (*Polygonatum odoratum*)
Epiaire des forêts (*Stachys silvatica*)
Germandrée petit chêne (*Teucrium chamaedrys*)
Viorne lantane (*Viburnum lantana*)
Dompte-venin officinal (*Vincetoxicum hirundinaria*)